

第2類
医薬品

フェイス

Zα

温感

7枚入

サイズ:7cm×10cm

Hisamitsu

7枚入

サイズ:7cm×10cm

保存に便利なチャック付き

フェイス

ジクロフェナクナトリウム 2.0%

ℓ-メントール 配合・ノニル酸ワニルリアミド配合

3トリプル鎮痛処方

Zα

当社従来品に比べて
包装サイズを小さく
しました。

温感

つらい
痛み24時間
1日1回セルフメディケーション
税 控除 対象ピッタリフィット
全方向伸縮

第2類医薬品

製造番号

使用期限

フェイス

Zα

温感

7枚入

サイズ:7cm×10cm



フェイス

Zα

温感

第2類医薬品

7枚入

サイズ:7cm×10cm

お客さま相談室

0120-133250

受付時間/9:00~17:50(土日祝日を除く)

お客さま相談室

0120-149-931

受付時間/9:00~17:50(土日祝日を除く)

お客さま相談室

0120-149-931

受付時間/9:00~17:50(土日祝日を除く)

お客さま相談室

0120-149-931

受付時間/9:00~17:50(土日祝日を除く)

お客さま相談室

0120-149-931

受付時間/9:00~17:50(土日祝日を除く)

お客さま相談室

0120-149-931

受付時間/9:00~17:50(土日祝日を除く)

お客さま相談室

0120-149-931

受付時間/9:00~17:50(土日祝日を除く)

お客さま相談室

0120-149-931

受付時間/9:00~17:50(土日祝日を除く)

お客さま相談室

0120-149-931

ご使用に際して、この説明書を必ず
お読みください。また、必要なとき
にすぐ読めるように大切に保管して
ください。ここを
押し開けて
ください。包装 7枚(7cm×10cm)
経皮鎮痛消炎テープ剤

第2類医薬品

販売名:フェイス®Zαジクサス®温感

効能・効果

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎
(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、
ねんざ

用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日1回1~2
枚を患部に貼付してください。ただし、1回あ
たり2枚を超えて使用しないでください。な
お、本成分を含む他の外用剤を併用しないで
ください。

(用法・用量に関連する注意)

(1)15歳未満の小児に使用させないでください。(2)
用法・用量を厳守してください。(3)本剤は、痛みやは
れ等の原因になっている病気を治療するのではなく、
痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症
状がある場合だけ使用してください。(4)貼った患部
をコップや電気毛布等で温めないでください。(5)強
い刺激を感じることがありますので、入浴の1時間前
には本剤をはがしてください。また、入浴後は30分
くらいしてから使用してください。(6)皮膚の弱い人は、
使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角
の貼片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆ
み、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使
用してください。(7)皮膚の弱い人は、同じところに続
けて使用しないでください。(8)1回あたり、24時間
を超えて貼り続けしないでください。さらに、同じ患部
に貼りかえる場合は、その貼付部に発疹・発赤、かゆ
み、かぶれ等の症状が起きていないことを確かめてから
使用してください。(9)同じ部位に他の外用剤を併
用しないでください。(10)汗をかいたり、患部がぬれ
ている時は、よく拭き取ってから使用してください。

成分・分量 (膏体100g中)

ジクロフェナクナトリウム…2.0g
ℓ-メントール…3.5g
ノニル酸ワニルリアミド…0.01g添加物として、ステチン・イソブレン・ステチン・ロック共重
合体、テルペン樹脂、BHT、ポリイソブレン、流動パラフィン、
その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保
管してください。(2)小児の手の届かない所に保管して
ください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤
用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
(4)使用期限を過ぎた商品は使用しないで
ください。(5)開封後はチャックをしっかり
閉めて保管してください。

△ 使用上の注意

×してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやす
くなります。

- 次の人は使用しないでください。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こした
ことがある人。(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)
妊婦又は妊娠していると思われる人。(4)15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みず
むし・たむし等又は化膿している患部。
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用し
ないでください。
4. 連続して2週間以上使用しないでください。

■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談
ください。
(1)医師の治療を受けている人。(2)他の医薬品を使用し
ている人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことが
ある人。(4)テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人。
(5)次の診断を受けた人。消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎
臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ(6)次の医薬品の投与
を受けている人。ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リ
チウム、メトトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤、ステロ
イド剤、利尿剤、シクロスポリン、選択的セロトニン再取り込
み阻害剤(7)高齢者。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性が
ありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、
薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、ヒリヒリ 感、皮膚のあれ、刺激感、色素沈着、水疱、落屑 (皮膚片の細かい脱落)

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合
は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィ ラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声 のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦し さ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎 光線過敏症	貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、 刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症状や 色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、 かゆみ等の症状が全身に広がる場合があります。 また日光が当たった部位に症状があらわれ たり、悪化することがあります。

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中
止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談
ください。

▼本製品についてのお問い合わせは、お住まいの地域の、最
近の、または白の「お客さま相談室」までお願いいたします。
お客さま相談室 0120-133250
受付時間/9:00~17:50(土日祝日を除く)
お客さま相談室 0120-149-931
受付時間/9:00~17:50(土日祝日を除く)

1