

薄い・密着、はがれにくい

# のびのびサロンシップ<sup>®</sup> フィット<sup>α</sup> **フィット**

〈冷感〉鎮痛消炎シップ剤

無臭性

**商品の特長**

- シップ独特の「におい」をなくした、こちよい冷感の〈無臭性〉鎮痛消炎冷感シップ剤。
- 薄く軽いので、使用部位にしっかり密着。
- シップの角を丸くする事で衣類に引っかからず、はがれにくくなりました。
- 伸縮自在で、関節部位にもぴったりフィット。
- フィルムがはがしやすく、貼りやすいシップです。
- 1枚ずつ取り出しやすく、コンパクトな包材の「ポケシップ<sup>®</sup>」です。

**⚠️ [使用上の注意]**

**❌ してはいけないこと** [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

**🗨️ 相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

**【効能・効果】** 筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、肩こり、腰痛、関節痛、しもやけ

**【用法・用量】** 1日1～2回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。

**【成分・分量】**

成分	含量(膏体100g中)
サリチル酸グリコール	2.0g
トコフェロール酢酸エステル	1.0g

添加物として、エデト酸ナトリウム、グリセリン、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、パラベン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、その他4成分を含有します。

**保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) ご使用後は中身の乾燥を防ぐためしっかりとシールを閉めてください。

《包 装》10cm × 14cm…………… 10枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：TEL.0120-133250 受付時間／9:00～17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

**効能・効果**

筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、肩こり、腰痛、関節痛、しもやけ

**用法・用量**

1日1～2回患部に貼付してください。

**〈用法・用量に関連する注意〉**

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。

**成分・分量**

成分含量(膏体100g中)  
 サリチル酸グリコール …………… 2.0g  
 トコフェール酢酸エステル …… 1.0g

添加物として、エデト酸ナトリウム、グリセリン、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、パラベン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、その他4成分を含有します。

**保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) ご使用後は中身の乾燥を防ぐためしっかりとシールを開けてください。



製造番号  
 使用期限

袋 : PE, M, PET  
 シール材 : PP, PET 2E175M

1枚ずつ  
 取り出しやすい  
 ポケシップ®



シップの  
 サイズ  
 そのまま

Hisamitsu®

10枚入  
 サイズ: 10cm×14cm

**外用薬**  
 経皮鎮痛消炎剤

のびのび®

**サロンシップ®** フィット®α



当社従来品に比べて  
 包装サイズを小さく  
 しました。



**無臭性**

第3類医薬品

筋肉痛・筋肉疲労・ねんざ・肩こり・腰痛

シップの端からはがれにくい



丸かど®シップ  
 ▲開け口

薄い・密着  
 はがれにくいシップ

冷感

詳しい情報は  
 こちら▼



▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。  
 製造 久光製薬株式会社  
 販売元 久光製薬株式会社  
 〒841-0017 鳥栖市田代大宮町 408番地  
 https://www.hisamitsu.co.jp  
 ▲当社HELLO!ecoプロジェクトの詳細はこちら▼

お客様相談室 ☎0120-133250  
 受付時間 / 9:00-17:50  
 (土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

セルフメディケーション  
 税 経費対象

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

**第3類医薬品**

〈冷感〉鎮痛消炎シップ剤

販売名: のびのび®サロンシップ®フィット®α

サイズ: 10cm×14cm  
**10枚入**

〔ご使用方法〕○表面のシールを開け口のところから開け、1枚ずつ取り出してお使いください。○中身の乾燥を防ぐため、ご使用後はシールを元のようになりしめてください。

**△ 使用上の注意**

**×してはいけないこと**

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

**■相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状がよくなるない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。