

色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がる場合があります。また日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

3、5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ

用法・用量

ライナーをはがし、1日1回患部に貼付してください。ただし、1回あたり2枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 15歳未満の小児に使用させないでください。(2) 用法・用量を厳守してください。(3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(5) 1回あたり、24時間を超えて貼り続けしないでください。さらに、同じ患部に貼りかえる場合は、その貼付部に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(6) 同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。(7) 汗をかくいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。

成分・分量(膏体100g中)

ジクロフェナクナトリウム……………1.0g

添加物として、亜硫酸Na、エドト酸ナトリウム水和物、 β -メントール、グリセリン、CMC-Na、ジエタノールアミン、ゼラチン、二酸化ケイ素、パラベン、BHT、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、硫酸Al/K、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。(4) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。(5) ご使用後は中身の乾燥を防ぐためしっかりとシールを開けてください。



製造番号

使用期限



袋 : PE, M, PET

シールふた : PET, PP 4E179M

1枚ずつ
取り出しやすい
ポケシップ®



当社従来品に比べて
薬袋のプラスチック
使用量を減らしました。

Hisamitsu®

7枚入

サイズ:10cm×14cm

フェイタス®
第2類医薬品 シップ®
ジクサス®

ジクロフェナクナトリウム1.0%配合

関節・筋肉
などの
つらい痛みに
24時間
1日1回

シップの端からはがれにくい



ピットリフィット!
全方向伸縮自在!

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 久光製薬株式会社

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

<https://www.hisamitsu.co.jp>

▲当社HELLO!eco!プロジェクトの詳細はこちら。副作用被害救済制度: ☎0120-149-931

微香性

セルフメタケーション
(税) 控除対象

お客様アンケート・
商品情報は
こちらへ▼

お客様相談室: TEL.0120-133250

受付時間 / 9:00～17:50
(土日・祝日・会社休日を除く)



ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

経皮鎮痛消炎剤
販売名: フェイタス®Zジクサス®シップ®

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

「守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。」
1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。(5) 次の部位には使用しないでください。(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用しないでください。4. 連続して2週間以上使用しないでください。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 他の医薬品を使用している人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) パップ剤がかぶれ等を起こしたことがある人。(5) 次の診断を受けた人。消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ(6) 次の医薬品の投与を受けている人。ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リチウム、メトトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤、ステロイド剤、利尿剤、シクロスポリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤(7) 高齢者。2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、皮膚のあれ、刺激感、色素沈着、水疱、落屑[らくせつ(皮膚片の細かい脱落)]

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦し、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎 光線過敏症	貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・たれ等の激しい皮膚炎症状や色