

効能・効果
腰痛、関節痛（五十肩など）、筋肉痛、腱鞘炎（手・手指の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲（うちみ）、ねんざ、肩こりに伴う肩の痛み

用法・用量
ライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

〈用法・用量に関する注意〉
(1) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
(2) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の薄片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成分・分量（膏体100g中）
インドメタシン……1.0g
L-メントール……1.2g

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、オレイン酸ソルビタン、グリセリン、ケイ酸A、ゼラチン、D-ソルビトール、パラベン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、メタケイ酸アルミン酸Mg、その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意
(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）。(4) ご使用後は中身の乾燥を防ぐためしっかりとシールを開めてください。



製造番号
使用期限
袋 : PE, M, PET
シールふた : PET, PP 1E123M


1枚ずつ
取り出しやすい
ポケシップ®



この薬袋はバイオマス
10%の白インキを使用
しています。

Hisamitsu®

10枚入
サイズ: 10cm×14cm



シップの
サイズ
そのまま

腰痛・関節痛・筋肉痛・ねんざ・肩こりに伴う肩の痛み

のびのび®

第2類医薬品

サロンシップ®EX

インドメタシン1.0%

痛み



中身の乾燥を防ぐため、ご使用後は
シールをしっかりと閉めてください。

シップの端から
はがれにくい



丸かど®シップ

微香性・薄い・密着
はがれにくいシップ

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元

久光製薬株式会社

〒84-0017 鳥栖市田代大官町408番地
https://www.hisamitsu.co.jp

▲当社HELLO!ecoプロジェクトの詳細はこちらへ。

お客様相談室: TEL.0120-133250

受付時間/9:00～17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

冷感

お客様
アンケート・
商品情報は
こちらへ。▼



セルフメディケーション
税 控除 対象

ご使用に際して、この説明書を必ず
お読みください。また、必要なとき
にすぐ読めるように大切に保管して
ください。

第2類医薬品

〈冷感〉鎮痛消炎シップ剤
販売名:
のびのび®サロンシップ®
フィット®EX

10枚入
サイズ:
10cm×14cm

【ご使用方法】○表面のシールを開
け口のところから開け、1枚ずつ取り
出してお使いください。○中身の乾
燥を防ぐため、ご使用後はシールを
元のようにしっかりと閉めてください。

△ 使用上の注意
❌ してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化し
たり、副作用が起きやすくなり
ます。

1.次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりア
レルギー症状を起こしたことがあ
る人。(2) ぜんそくを起こしたこと
がある人。(3) 15歳未満の小児。

2.次の部位には使用しないでくだ
さい。(1) 目の周囲、粘膜等。(2)
湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・
たむし等又は化膿している患部。
3.連続して2週間以上使用しない
でください。

■ 相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師
又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思わ
れる人。(3) 薬などによりアレルギー
症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた
場合は副作用の可能性があるので、
直ちに使用を中止し、この袋を
持って医師、薬剤師又は登録販
売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、 はれ、ヒリヒリ感、 熱感、乾燥感、かぶれ

3.5～6日間使用しても症状がよ
くならない場合は使用を中止し、こ
の袋を持って医師、薬剤師又は登
録販売者にご相談ください。