

【100mL 製剤】

OPEN

ご使用に際して、この説明書を必ずお読み下さい。また、必要な時にすぐ読めるように大切に保管して下さい。

スプレー式鎮痛消炎剤 エアー[®]サロンパス[®]Z

△【使用上の注意】 **第2類医薬品**

×してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]1.次の人は使用しないでください。(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)ぜんそくを

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 **久光製薬株式会社**

〒841-0017 鳥栖市田代大宮町408番地
https://www.hisamitsu.co.jp

お客様相談室：TEL.0120-133250
受付時間/9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931 1X25HD



起こしたことがある人。(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。(4)15歳未満の小児。2.次の部位には使用しないでください。(1)目の周囲、粘膜等。(2)皮膚の弱い部位(顔、頭、わきの下等)。(3)湿疹、かぶれ、傷口。(4)みずむし・たむし等又は化膿している患部。3.本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用しないでください。4.長期連用しないでください。

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)次の医薬品の投与を受けている人。ニューキノロン系抗菌剤 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、皮膚のあれ、刺激感、色素沈着、水疱、落屑(皮膚片の細かい脱落)

まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎 光線過敏症	塗布部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素

沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がる場合があります。また日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。【効能・効果】腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ【用法・用量】1日3~4回、適量を患部に噴射塗布

してください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。<用法・用量に関連する注意>(1)15歳未満の小児に使用させないでください。(2)用法・用量を厳守してください。(3)本剤は、痛みやはれ等の原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(4)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状

が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。(5)顔に向けて噴射しないでください。(6)大量・広範囲には使用しないでください。(7)外用にのみ使用し、吸入しないでください。吸入によりめまい、吐き気、せき、鼻やのどの刺激等の症状を起こすことがありますので、できるだけ吸入しないよう、また周囲の人にも十分注意して使用してください。(8)よく振って使用してください。(9)患部まで10cmの距離で噴射してください。(10)同じ箇所に連続して3秒以上噴射しないでください(凍傷になるおそれがあります)。(11)1週間あたり、原液として50g(7日間で本剤1本)

を超えて使用しないでください。(12)同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。(13)通気性の悪いもの(ラップフィルム、矯正ベルト等)で使用部位を覆い、密封状態にしないでください。【成分・分量】成分含量(原液 100g中)ジクロフェナクナトリウム...1g、ℓ-メントール...3g 添加物 アジピン酸ジイソプロピル、エタノール、乳酸、ヒドロキシプロピルセルロース、プロピレングリコール、DMEを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない

所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。(4)金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。(5)火気に近づけないでください。(6)火花が出る所で使用しないでください。(7)使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。【廃棄の際のガス抜きの方法】<ガス抜きの注意事項>必ず中身を使い切ってから、火気のない風通しの良い屋外で行ってください。・ガス抜き中は、わずかに

残った薬液がガスと共に噴き出しますので、顔を近づけないでください。・本品のキャップ以外は使用しないでください。・噴射されるガスを直接吸い込まないよう注意してください。<ガス抜きの方法>①キャップをはずします。②平らなところに伏せておきます。③キャップの天面中央の穴に本体を逆さまにして押し込み、噴射音が消えるまで放置します。④噴射音が完全に消えてから市町村等で定められた方法により廃棄してください。



あわせる
る
は
O
P
E
N
に