

第2類医薬品 Hisamitsu 10枚入 サイズ: 7cm×10cm

FEITAS®

フェイタス®

フェルピナク配合テープ剤

つらい
痛みのもとに
直接浸透

ビタミンE・微香性

HELLO! eco! 当社従来品に比べてパッケージ(外箱)を省き紙の使用量を減らしました。

セルフレベリタレーション 税 控 除 対 象

ビッタリフィット 全方向伸縮

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

お客様相談室：TEL.0120-133250 受付時間／9:00～17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

製造販売元  久光製薬株式会社

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様
アンケート・
商品情報は
こちらへ▶



▼開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

切のり 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

1. 次の人は使用しないでください。(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。2. 次の部位には使用しないでください。(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。3. 連続して2週間以上使用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しき、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ、肩こりに伴う肩の痛み

用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

経皮鎮痛消炎テープ剤
販売名：フェイタス®

第2類医薬品

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(3) 汗をかいたり皮膚がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。(4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の贴片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成分・分量 (膏体100g中)

フェルピナク……………5.0g
ℓ-メントール……………3.5g
トコフェロール酢酸エステル……………2.3g
(*ビタミンE誘導体)

添加物として、水添ロジングリセリンエステル、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、ステアリン酸亜鉛、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他1成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光や高温を避け、湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。(4) 開封後はチャックをしっかり閉めて保管してください。(5) 使用期限(この薬袋に記載)を過ぎた商品は使用しないでください。

※画像は原寸大



副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

1E197T



製造番号

使用期限