

切り口 → → → 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。 → → →

▼開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

第2類医薬品

hisamitsu®

7枚入 サイズ:
10cm×14cm

FEITAS®

温感

販売名：フェイス®Z
プレミアム温感 大判

ジクロフェナクナトリウム 2.0% + 4つの有効成分

大判
10cm×14cm

つらい痛みのもとに
直接浸透
24時間1日1回



包装袋の外層に
リサイクルPET80%を
使用しています。

セルフメディケーション
税 控除 対象

広い部位を
1枚でおおえる

切り口 → → → 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。 → → →

▼開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、
必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

包装 7枚(10cm×14cm)

経皮鎮痛消炎テープ剤

販売名：フェイス®Zプレミアム温感 大判 第2類医薬品

特長

- 効きめ成分ジクロフェナクナトリウムを2.0%配合した、経皮鎮痛消炎テープ剤。
- 微香性なので、就寝時や人前でも気になりません。
- 肩や首・腰・関節・筋肉などのつらい痛みに優れた効きめをあらわします。
- 全方向伸縮で肌にピッタリフィットします。
- ノニル酸γノニルアミドのはたらきで、心地よい温感作用をあらわします。
- 腰などの広い部位を一枚でおおえる、大判サイズ。

お客様
アンケート
商品情報は
こちらへ▶



▼光製薬の環境への取り組み
HELLO!eco!プロジェクトの詳細はこちらへ。
<https://www.hisamitsu.co.jp>

△ 使用上の注意

× してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用しないでください。
4. 連続して2週間以上使用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 他の医薬品を使用している人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人。(5) 次の診断を受けた人。消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ(6) 次の医薬品の投与を受けている人。ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リチウム、メトトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤、ステロイド剤、利尿剤、シクロスポリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤(7) 高齢者。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、ヒリヒリ感、皮膚のあれ、刺激感、色素沈着、水疱、落屑(皮膚片の細かい脱落)

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎 光線過敏症	貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がる場合があります。また日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、
又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

※画像は原寸大

製 造 久光製薬株式会社
販売元 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お客様相談室：TEL.0120-133250
受付時間／9:00～17:50(土日・祝日・会社休日を除く)



製造番号

使用期限