

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬 サンシップリメント

第3類医薬品

あせも、かぶれ、湿疹などの皮膚(ふ)症状は日常よく見られますが、かゆみや発赤が強い場合は無意識のうちに搔きむしまる、さらに悪化させてしまいます。その症状の悪化をおさえ、保護する作用をもっているのがサンシップリメントです。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|--------------|
| 皮膚(ふ) | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

あせも、かぶれ、かゆみ、ただれ、湿疹、皮ふ炎、しもやけ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】

1日数回適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- 用法及び用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
- なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用し、内服しないでください。

【成分・分量と作用】

100g 中

| 成 分 | 分 量 | 作 用 |
|-----------|-------|---|
| ジフェンヒドラミン | 1 g | 抗ヒスタミン作用により、湿疹、皮ふ炎、かぶれなどをおさえ、また、かゆみを止める作用もあります。 |
| 酸化亜鉛 | 15 g | 分泌物を吸収し、乾燥させることにより患部の保護、治癒を助けます。 |
| l-メントール | 0.5 g | おだやかな局所冷感刺激作用でかゆみをおさえます。 |
| dl-カンフル | 0.5 g | |

添加物として、グリセリン、ステアリルアルコール、ラノリン、セタノール、プロピレン glycole、流動パラフィン、ミツロウ、ポリオキシエチレンラノリン、ベンザルコニウム塩化物液、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、スクワラン、パラベンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

T E L : 0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824