

非ステロイド性 鎮痒消炎剤

税 控除 対象

やさしくなじむ  
クリームタイプ

# 赤ちゃんから大人まで使える 皮膚治療薬

炎症や痛みを抑えるウフェナマート配合

炎症や痛みを抑える

ウフェナマート

不快なかゆみを抑える

リドカイン  
クロルフェニラミンマレイン酸塩

皮膚の血行を促進する

トコフェロール酢酸エステル



湿疹



かゆみ



おむつかぶれ

不快なかゆみをやさしく抑える

クリアガード クリーム

ウフェナマート配合

第2類医薬品

13g

鎮痒消炎剤

第2類医薬品

N<sub>10</sub>

13g

販売名 クリアガード

効能・効果 皮膚炎、かゆみ、湿疹、かぶれ、おむつかぶれ、ただれ、あせも

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意> (1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。

成分・分量 (100g中) ウフェナマート…5g リドカイン…1g クロルフェニラミンマレイン酸塩…1g トコフェロール酢酸エステル…0.5g 添加物：流動パラフィン、セタノール、ステアリルアルコール、ステアリン酸、白色ワセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、モノステアリン酸グリセリン、グリセリン、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

## △ 使用上の注意

■ 相談すること 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)湿潤やただれのひどい人。2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるの

関係部位	症状
皮膚(ふ)	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(ヒリヒリ感)、熱感、乾燥感

で、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い致します。

福地製薬株式会社

TEL: 0748-52-2323

受付時間: 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

開け口

ご使用に際しては、この箱の説明文を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

# 湿疹・かゆみ おむつかぶれに