

テピスクリーム

非ステロイド性鎮痒消炎薬

◆**テピスクリーム**は非ステロイド系抗炎症剤ウフェナマートを主成分にかゆみを抑える成分、リドカイン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、皮膚の血行を改善する、トコフェロール酢酸エステルを配合した外用剤です。皮膚炎、かゆみ、湿疹、おむつかぶれなどにすぐれた効果をあらわします。
赤ちゃんから大人まで、顔、腕、足、からだにお使い頂けます。
のびがよくべたつかないクリーム剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚（ふ）	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感（ヒリヒリ感）、熱感、乾燥感

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

皮膚炎、かゆみ、湿疹、かぶれ、おむつかぶれ、ただれ、あせも

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- 用法及び用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

【成分・分量と作用】

100g中

成 分	分 量	作 用
ウフェナマート	5g	皮膚刺激作用の弱い非ステロイド性抗炎症成分で、炎症部位に直接作用し、患部の炎症や痛みを抑えます。
リドカイン	1g	局所麻酔作用により、皮膚炎、かぶれなどに伴う不快なかゆみや痛みを抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	1g	抗ヒスタミン作用により、患部の炎症を緩和し、かゆみを抑えます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	血行を促進し、治癒を促します。

添加物として、流動パラフィン、セタノール、ステアリルアルコール、ステアリン酸、白色ワセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、モノステアリン酸グリセリン、グリセリン、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチルを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

福地製薬株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824
TEL: 0748-52-2323
受付時間: 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元
福地製薬株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824