

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931



使用期限

製造番号

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い致します。

製造販売元 福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尾824

お客様相談窓口 0748-52-2323

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)



かゆみ 虫さされ かぶれ

セルフメディケーション

税 控 除 対 象

第3類医薬品

ムシクール

20g

第3類医薬品

販売名: ムシクールSクリーム

【効能・効果】 湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

【成分・分量】 100g中

ジフェニヒドラミン.....1.0g
グリチルレチン酸.....0.3g
イソプロピルメチルフェノール.....0.1g
dl-カンフル.....7.0g
l-メントール.....5.0g
添加物: 流動パラフィン、ベヘニルアルコール、ステアリルアルコール、モノステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、1,3-ブチレングリコール、パラベン

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

ご使用に際しては、この箱の説明文を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

【用法・用量】 1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

開封口