

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

インドメタシン1.0%配合 鎮痛・消炎薬

第2類医薬品

パスロックID1%クリーム

特 徴

- ・パスロックID1%クリームに配合されるインドメタシンが、痛み、はれに直接作用し、肩こりの痛み、筋肉痛、腰痛を鎮めます。
- ・のびのよいクリーム剤ですので、べたつきがなく、擦り込むことでより効果的にお使い頂けます。
- ・ ℓ -メントールを配合し、爽快な使い心地が続きます。

こんな時に・・・



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)ぜんそくを起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。
- (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

用法・用量

1日4回を限度として適量を患部に塗擦してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)11歳未満の小児に使用させないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。
- (5)1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- (6)薬剤塗擦後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

成分（100g中）

成 分	分 量	は た ら き
インドメタシン	1.0g	鎮痛作用・消炎作用が患部に直接はたらき、痛みやはれを鎮めます。
ℓ-メントール	3.0g	清涼感を持続させ、また鎮痛作用で痛みをやわらげます。

添加物：クロタミトン、ミリスチン酸イソプロピル、精製ラノリン、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、カルボキシビニルポリマー、カルメロースナトリウム、グリセリン、亜硫酸水素ナトリウム、エデト酸ナトリウム水和物、pH調整剤

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
- (5)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。
- (6)本剤が衣類や寝具などに付着すると黄色く着色することがあるので、汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落としてください（有効成分インドメタシンによる着色）。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。
前田薬品工業株式会社 お客様相談室
〒930-0916 富山市向新庄町一丁目18番47号
電話：076-451-3731(代表) AM9：00～PM5：00（土日祝日を除く）