

鎮痒消炎剤【販売名】テシトンEX液 第②類医薬品

PVA

(プレドニゾン吉草酸エステル
酢酸エステル)配合



使用上の注意

ご使用前に、必ずこの説明文書をお読み下さい。
また、必要な時にすぐに読めるように大切に保管して下さい。



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

- (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2) 創傷面、目の周囲、粘膜等。

2. 顔面には、広範囲に使用しないこと

3. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、あせも、じんましん、虫さされ

【用法・用量】 1日数回、適量を患部に塗布する

《用法・用量に関連する注意》

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。

【成分】(100mL中)

プレドニゾン吉草酸エステル
酢酸エステル……………0.15g
ジフェンヒドラミン塩酸塩……………1.0g
l-メントール……………3.5g
dl-カンフル……………1.0g
イソプロピルメチルフェノール…0.1g
【添加物】ラウロマクロゴール、プロピレングリコール、ヒドロキシプロピルセルロース、エタノール

《成分に関連する注意》

本剤はアルコールを含んでいるので、塗布時にしみることがある。

《保管及び取扱上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと。
- (6) 使用期限(容器底面に記載)の過ぎた製品は使用しないこと。
- (7) 本剤は、メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等にふれると変質することがあるので、付着しないように注意すること。

発売元：

協和薬品工業株式会社

営業本部：岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号

お客様相談室 ☎0120-468771

製造販売元：

前田薬品工業株式会社

富山県富山市向新庄町1-18-47

副作用被害救済制度

☎0120-149-931