

ご使用に際して、この説明書をよくお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

外用鎮痛消炎薬

第3類医薬品

ゼノールしっぷびたっと[®]

【特長】

1. 「消炎効果と冷しっぷ効果でよく効きます」 サリチル酸グリコールの消炎効果と高含水基剤の冷しっぷ効果で関節痛、筋肉痛、捻挫（ねんざ）によく効きます。
2. 「よく伸びて、ピタッと付いてはがれない」 伸縮性の高い不織布と、粘着性の高い膏体を使用していますので、ひじ、ひざ等動きの多いところにもピタッとついて、しっぷ効果を発揮します。
3. 「チャック付きアルミ袋入り」 保存に便利なチャック付きアルミ袋がしっぷ剤の乾燥を防ぎます。

【使用上の注意】

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【用法・用量】

薬面のフィルムをはがして、1日1～2回患部に貼ってください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 患部の汗をふきとってから使用してください。

【効能・効果】

関節痛、筋肉痛、捻挫（ねんざ）、肩こり、筋肉疲労、腰痛、打撲、骨折痛、しもやけ

【成分】

膏体 100 g 中（面積875cm²当たり）

成 分	含 量
サリチル酸グリコール	1.70 g
l-メントール	0.50 g
トコフェロール酢酸エステル	0.30 g

添加物：ゼラチン、プロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、ポリソルベート 80、エデト酸 Na、パラベン、グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリアクリル酸、カルメロース Na、酒石酸、ヒマシ油、プロピレングリコール脂肪酸エステル、アクリル酸デンプン、酸化チタン、水酸化 Al

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉め、外気にふれないようにしてください。
- (5) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないでください。

包 装

- 1 箱 (14cm×10cm) ×12枚
- 1 箱 (14cm×10cm) ×24枚
- 2 箱パック (14cm×10cm) ×48枚

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

TEL:0120-149-931 (フリーダイヤル)

販売元
 **大鵬薬品工業株式会社**
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
<https://www.taiho.co.jp/>

製造販売元

三笠製薬株式会社

東京都練馬区豊玉北 2-3-1