

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

鎮痛消炎プラスター剤
パスタイム[®]A

第3類医薬品

パスタイムAは肩こり、腰痛、筋肉痛等にすぐれた鎮痛消炎効果のある、ニオイをおさえた微香性プラスター剤です。

⚠【使用上の注意】

☒ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 心	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、関節痛、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】 1日数回患部に貼付してください。

用法・用量に関する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 (2) はった患部をコタツや電気毛布などで温めないでください。
 (3) 強い刺激を感じることがあるので、入浴の30分以上前にはがしてください。
 　また、入浴後には30分位してからはってください。
 (4) 汗などをよくふき取り、患部をきれいにしてから使用してください。
 (5) 皮ふの弱い人は、同じところに続けてはらないでください。

【成分・分量】 基本 100g 中

サリチル酸グリコール	4.3g
メントール	6.1g
トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）	4.3g
ノニル酸ワニリルアミド	0.012g

添加物としてBHT、生ゴム、水素添加ロジングリセリンエステル、スチレン・イソブレン・スチレンプロック共重合体、ポリブテン、その他2成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- 開封後は袋の口を折りまげて保管し、早めに使用してください。
- 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

【包 装】 5.5cm×7.2cm 20枚（10枚/袋×2袋）、40枚（10枚/袋×4袋）、60枚（10枚/袋×6袋）

製造販売元 **祐徳薬品工業株式会社**

佐賀県鹿島市大字納富分 2596番地1

[お客様相談窓口] TEL.0954-63-1320

受付時間 9:00~17:00 (土,日,祝日は除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

TEL 0120-149-931

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

鎮痛消炎 プラスター パスタイルA[®]

第3類
医薬品

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
0120-149-931

パスタイルAはすぐれた鎮痛
消炎効果のあるプラスター剤
です。

⚠ [使用上の注意]

☒ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]

1. 次の部位には使用しないでください。

(1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口

⚑ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 脊	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

[効能・効果] 肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、関節痛、骨折痛、しもやけ

製造番号

使用期限

[用法・用量] 1日数回患部に貼付してください。

用法・用量に関する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) はった患部をコタツや電気毛布などで温めないでください。
- (3) 強い刺激を感じることがあるので、入浴の30分以上前にはがしてください。また、入浴後にはる場合は30分位してからはってください。
- (4) 汗などをよくふき取り、患部をきれいにしてから使用してください。
- (5) 皮ふの弱い人は、同じところに続けてはらないでください。

[成分・分量] 膜体100g 中

サリチル酸グリコール 4.3g
l-メントール 6.1g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) 4.3g
ノニル酸ワニリルアミド 0.012g
添加物としてBHT、生ゴム、水素添加ロジングリセリンエステル、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ポリブテン、その他2成分を含有します。

[保管及び取扱い上の注意]

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 開封後は袋の口を折りまげて保管し、早めに使用してください。
- 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

製造販売元

 祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1

[お客様相談窓口] TEL.0954-63-1320
受付時間9:00~17:00(土、日、祝日は除く)