

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

鎮痛消炎プラスター剤 パスタイムフィット®A

第3類医薬品

【特長】

- 関節部の動きにもぴったりフィットします。
- 有効成分の吸収が速く、コリや痛みにすぐれた効きめをあらわします。
- 目立たない肌色で、ニオイをおさえた微香性プラスター剤です。
- トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）を配合しています。

⚠ 【使用上の注意】

⊗ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

1. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、関節痛、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】 1日数回患部に貼付してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 汗などをよくふき取り、患部をきれいにしてから使用してください。
- (3) 皮膚の弱い人は、同じところに続けてはならないでください。

【成分・分量】 膏体 100g 中

サリチル酸グリコール……………3.5g

l-メントール……………5.0g

トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）……2.0g

添加物としてBHT、生ゴム、水素添加ロジングリセリンエステル、脂環族飽和炭化水素樹脂、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、その他1成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
4. 開封後は袋の口を折り上げて保管し、早めに使用してください。
5. 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

【包装】 7cm×10cm 35枚（7枚/袋×5袋）

製造販売元  祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分 2596 番地 1


【お客様相談窓口】 TEL.0954-63-1320

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日は除く）

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

 0120-149-931