

ここから




手前に引きながら切ってください



手前に引きながら切ってください



段差がついてつかみやすく開けやすい



なみなみカット

セルフメディケーション
税 控除 対象

ロキソプロフェンNa[※]配合

腰・肩の痛み

経皮鎮痛消炎剤

第2類医薬品

パスタイン[®] Lx-L

テープ 微香性



24時間
持続

※水和物として 10cm×14cm

ワイドサイズ

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付する。

<用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守してください。(2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(3)1日あたり2枚を超えて使用しないでください。(4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。(5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成分・分量

膏体100g中 [1枚あたり(10cm×14cm) 膏体量2g]
ロキソプロフェンナトリウム水和物 5.67g(無水物として5g) 添加物：L-メントール、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、脂環族飽和炭化水素樹脂、流動パラフィン、ジブチルヒドロキシトルエン、その他5成分

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャックをきちんと閉めて保管してください。(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、アルミ袋を開封した後は、なるべく早く使用してください。

表面の矢印から開封してください。(裏面から切ると段差がつきません。)

チャック 開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

品番：LXW7

包装 10cm×14cm

使用開始日をご記入ください。

経皮鎮痛消炎剤
腰・肩の痛みに **パスタムLX-L** **第2類医薬品**
ワイドサイズ

年 月 日

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないでください。
 (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人(3) 15歳未満の小児
- 次の部位には使用しないでください。
 (1) 目の周囲、粘膜等(2) 湿疹、かぶれ、傷口(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部
- 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。
- 連続して2週間以上使用しないでください。(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください)

🗨️ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 (1) 医師の治療を受けている人(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人(4) 高齢者(5) 次の診断を受けた人
 気管支ぜんそく

- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢・軟便
- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合又は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(他の疾患の可能性がります)

上手な貼り方


① 中央のフィルムをはがしてください。




② 粘着面を患部へ貼り固定してください。



③ 片方のフィルムをはがしながら貼ります。



④ もう片方も同じように貼ってください。



● 患部が汗などでぬれている場合は、よく拭き取ってから使用してください。

日本製

副作用被害救済制度の問合せ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
 ☎0120-149-931

製造販売元

⊕ 祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1
 [お客様相談窓口] TEL.0954-63-1320
 受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)