

肩こり・腰痛・筋肉痛に

パスタイム[®] 温感 プラス

トリプル処方

サリチル酸
グリコール

l-メントール

ノナン酸
バニリルアミド

もちもち膏体

(7cm×10cm)

ほんのりアロマ

温感タイプ

MEDICAL PLASTER
pastime

シトラスの香り

セルフメディケーション
税控除対象

第3類医薬品

押し開けてください

鎮痛消炎 plaster 剤

パスタイム[®]温感プラス

第3類
医薬品

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
☎0120-149-931

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

パスタイム温感プラスは温感作用を発揮するノナン酸バニリルアミドを配合し、肩こり、腰痛、筋肉痛等にすぐれた鎮痛消炎効果のある、ニオイをおさえた微香性プラスター剤です。

⚠ [使用上の注意]

☒ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]

1.次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等
- (2)湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲（うちみ）、捻挫、関節痛

〔用法・用量〕

表面のライナー（フィルム）をはがし、1日数回、患部に貼付してください。

用法・用量に関する注意

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

〔成分・分量〕膏体100g中

サリチル酸グリコール 6.0g
l-メントール 2.0g
ノナン酸バニリルアミド 0.01g
添加物としてスチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、脂環族飽和炭化水素樹脂、水素添加ロジングリセリンエステル、流動パラフィン、香料、その他2成分を含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- 4.開封後は袋の口を折りまげて保管し、早めに使用してください。
- 5.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

〔包装〕7cm×10cm

実物大

日本製

製造販売元

 祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1

〔お客様相談窓口〕TEL.0954-63-1320
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)