

ここから → → 手前に引きながら切ってください → →

手前に引きな  
がら切ってく  
ださい



段差がついて  
つかみやすく  
開けやすい

なみなみカット

# ロキソプロフェンNa<sup>\*</sup>配合

経皮鎮痛消炎剤 第2類医薬品

# パスタイム<sup>®</sup> LX

## PREMIUM

### トリプル処方

ロキソプロフェンNa水和物 L-メントール ビタミンE

肩・腰の  
つらい  
痛みに



24時間持続

テープ 微香性

(1日4枚まで)

使用開始日をご記入ください。

年 月 日

ピタッと  
密着

全方向  
伸縮タイプ

※水和物として  
セルフメディケーション

税控除対象

表面の矢印から開封してください。(裏面から切ると段差がつきません。)

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

経皮鎮痛消炎剤 **パスタイム® LX プレミアム** 第2類医薬品 品番：PLP21

チャック 開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。 包装 | 7cm×10cm

### ⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人 (3) 15歳未満の小児

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口  
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。

4. 連続して2週間以上使用しないでください。(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください)

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 高齢者 (5) 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある

ありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢・軟便  
4. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(他の疾患の可能性があります)

### 効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

### 用法・用量

表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付してください。  
<用法・用量に関する注意>

(1) 用法・用量を厳守してください。(2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(3) 1日あたり4枚を超えて使用しないでください。(4) 汗をかいだり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。(5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm 角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

### 成分・分量

膏体100g中 [1枚あたり(7cm×10cm)膏体量1g]  
ロキソプロフェンナトリウム水和物…5.67g (無水物として5g)  
l-メントール……………3.00g  
トコフェロール酢酸エステル……2.30g

添加物: スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、脂環族飽和炭化水素樹脂、水素添加ロジングリセリンエステル、流動パラフィン、ジブチルヒドロキシトルエン、その他3成分

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋をきちんと閉めて保管してください。(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、アルミ袋を開封した後は、なるべく早く使用してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造  
販売元



祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1

[お客様相談窓口] TEL.0954-63-1320

受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

パスタイム  
ブランドサイト



日本製