

切り口 → → → 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。 → → →

7枚入

サイズ:7cm×10cm

Hisamitsu®

ロキソプロフェン

Na テープα

経皮吸収型鎮痛 外用薬 ・抗炎症剤

つらい

痛みの元まで直接浸透!

微香性

第2類医薬品

3つの有効成分が効く

ロキソプロフェンNa水和物

L-メントール / ビタミンE 誘導体

24時間
1日1回

ピッタリフィット
全方向伸縮

(1日4枚まで)

セルフメディケーション

税 控除 対象

ご使用開始日をご記入ください。

年 月 日

切り口 → → → 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。 → → →

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

チャック 開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

第2類医薬品

経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 販売名: Hisamitsu® ロキソプロフェンNaテープα

包装 7枚(7cm×10cm)

使用上の注意

×してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。】

1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人 (3) 15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口 (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。
4. 連続して2週間以上使用しないでください。(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください。)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 高齢者 (5) 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しき、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢・軟便
4. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(他の疾患の可能性もあります。)

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手指の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。(2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(3) 1日あたり4枚を超えて使用しないでください。(4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。(5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の薄片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成分・分量 膏体100g中 [1枚あたり(7cm×10cm)膏体量1g]

ロキソプロフェンナトリウム水和物...5.67g(無水物として5g)
L-メントール...3.00g
トコフェロール酢酸エステル...2.30g
(※トコM/E誘導体)

添加物: ステレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブレン、脂環族飽和炭化水素樹脂、水素添加ロソングセリンエステル、流動パラフィン、ジブチルヒドロキソトルエン、その他3成分

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャックをきちんと閉めて保管してください。(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、アルミ袋を開封した後は、なるべく早く使用してください。

発売元 久光製薬株式会社
〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地
<https://www.hisamitsu.co.jp>

製造元 祐徳薬品工業株式会社
〒849-1393 佐賀県鹿島市大字柳高分259番地1

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

久光製薬お客様相談室：TEL.0120-133250
受付時間/9:00—17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造番号

使用期限



詳しい情報は
こちらへ



4 987188 116012



1FD04T