

切り口 → → → 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。 → → →

Hisamitsu®

ロキソプロフェン **EX**
Naテープ

大判

LOXOPROFEN SODIUM Tapes

経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 **外用薬**

つらい

痛みのもとまで直接浸透!

4つの有効成分が効く

ロキソプロフェンNa水和物 **8.1%**

L-メントール / ビタミンE誘導体* / グリチルリチン酸

サイズ:10cmx14cm



微 香 性

24時間1日1回

全方向伸縮自在

ご使用開始日をご記入ください。

年 月 日



久光製薬株式会社

第2類医薬品

セルフメディケーション

税 控除 対象

切り口 → → → 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。 → → →

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

チャック 開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 販売名: Hisamitsu® ロキソプロフェンNaテープ EX 大判

(10cm×14cm) **第2類医薬品**

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人
 - (3) 15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口 (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。
4. 連続して2週間以上使用しないでください。(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診察を受けてください。)

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 高齢者 (5) 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢・軟便
4. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(他の疾患の可能性あります。)

※画像は原寸大

詳しい
情報は ▶
こちらへ



効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、挫傷

用法・用量

表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付してください。

(用法・用量に関連する注意)

(1) 用法・用量を厳守してください。(2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(3) 1日あたり2枚を超えて使用しないでください。(4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。(5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成分・分量 膏体100g中 [1枚あたり(10cm×14cm)膏体量1.4g]

ロキソプロフェンナトリウム水和物	8.10g (加水物として7.14g)	トコフェロール酢酸エステル	2.30g
ε-メントール	3.50g	(*ビタミンE 誘導体)	
グリチルレチン酸	0.10g		

添加物: スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、脂肪族飽和炭化水素樹脂、水素添加ロジングリセリンエステル、流動パラフィン、ジブチルヒドロキシトルエン、その他3成分

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(試用の原因になったり品質が変わります。)(4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャックをきちんと閉めて保管してください。(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、アルミ袋を開封した後は、なるべく早く使用してください。

発売元 **久光製薬株式会社**
〒841-0017 島根県田代大宮町408番地
<https://www.hisamitsu.co.jp>

製造販売元 **祐徳薬品工業株式会社**
〒849-1393 佐賀県鳥栖市大字新宮分2596番地1

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

久光製薬お客様相談室: TEL.0120-133250
受付時間/9:00-17:50 (土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931