かゆみ、皮膚炎、
しっしんに

皮膚疾患外用薬

外用 雪の元

第３類医薬品

かゆみ、皮膚炎、
しっしんに

軟膏

皮膚疾患外用薬



かゆみ、皮膚炎、
しっしんに

皮膚疾患外用薬

外用 雪の元

軟膏
20g

かゆみ止め成分･殺菌消毒成分 配合

第３類医薬品

2502-TYP
SD

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

紙 箱

プラ 容　器
キャップ
袋：PE、金属

製造番号　　使用期限

セルフメディケーション税控除対象

4 979949 001965

【保管及び取扱い上の注意】
1.高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。2.小児の手の届かない所に保管してください。3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。) 4.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

販売名：外用雪の元

開封口

第３類医薬品

ご使用に際して、この箱の説明文をよくお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

## ⚠ 使用上の注意

### 相談すること

**1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)湿潤やただれのひどい人。

**2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

| 関係部位 | 症　状 |
|---|---|
| 皮　膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |

**3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

## 効能・効果

かゆみ、かぶれ、皮膚炎、じんましん、ただれ、しっしん、しもやけ、あせも、ひび

## 用法・用量

患部を清潔にしたのち、1日2～3回適量をすりこんでください。又は症状に応じてガーゼに適量を塗布して患部に貼付してください。

《用法・用量に関連する注意》
1.定められた用法・用量を守ってください。
2.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3.目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
4.本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

## 成分・分量(100g中)

酸化亜鉛 …… 10.0g
ジフェンヒドラミン …… 1.0g
イソプロピルメチルフェノール 1.0g
dℓ-カンフル …… 2.25g
添加物：d-ボルネオール、バレイショデンプン、ワセリン、パラフィン、香料

製造販売元
株式会社 雪の元 本店
奈良県橿原市大谷町182番地
お客様相談室
電話　0744-22-2440
受付時間　9:00～12:00、13:00～17:00
(土、日、祝日を除く)

## 保管及び取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。（2）小児の手の届かない所に保管してください。（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）（4）期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。


本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡ください。
〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地
株式会社　雪の元本店 お客様相談室
受付　9:00～12:00　TEL 0744-22-2440
時間 13:00～17:00　FAX 0744-22-2406
（土曜、日曜、祝日を除く）

製造販売元
株式会社 雪の元本店
奈良県橿原市大谷町182番地


20g入


2005-MRS


副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

第3類医薬品

TRADE MARK

抗ヒスタミン剤配合
皮膚疾患外用薬

プラ 袋
金　属：缶

# 外用 雪の元

## 使用上の注意

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
（1）医師の治療を受けている人。（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。（3）湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症　状 |
|---|---|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**効能・効果**　かぶれ、じんましん、かゆみ、しっしん、ただれ、しもやけ、皮膚炎、あせも、ひび

**用法・用量**　患部を清潔にしたのち、1日2～3回適量をすりこんでください。又は、症状に応じてガーゼに適量を塗布して患部に貼付してください。

## 用法及び用量に関連する注意

（1）定められた用法・用量を守ってください。（2）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。（3）目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。（4）本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

## 成分・分量及びはたらき

100g中

| 成分 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| 酸化亜鉛 | 10.0g | 炎症を鎮め、患部を保護 |
| ジフェンヒドラミン | 1.0g | かゆみを抑える |
| イソプロピルメチルフェノール | 1.0g | 殺菌作用 |
| dl-カンフル | 2.25g | かゆみを抑える |
| 添加物として、バレイショデンプン、ワセリン、パラフィン、d-ボルネオール、香料を含有する | | |

かゆみ、皮膚炎、しっしんに
皮膚疾患外用薬
外用 雪の元
第3類医薬品
かゆみ、皮膚炎、しっしんに
軟膏
皮膚疾患外用薬
第3類医薬品
皮膚疾患外用薬
外用 雪の元
かゆみ、皮膚炎、しっしんに
かゆみ止め成分
殺菌消毒成分
配合
軟膏
20g
2408-TYP
副作用被害救済制度
☎0120-149-931
紙 箱
容器
キャップ
袋:PE、金属
製造番号
使用期限
セルフメディケーション
税 控除 対象
4 979949 000012
【保管及び取扱い上の注意】
1.高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。2.小児の手の届かない所に保管してください。3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。) 4.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
販売名：外用雪の元
開封口
第3類医薬品
ご使用に際して、この箱の説明文をよくお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。
使用上の注意
相談すること
1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)湿潤やただれのひどい人。
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
関係部位 | 症状
皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ
3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
効能・効果
かゆみ、かぶれ、皮膚炎、じんましん、ただれ、しっしん、しもやけ、あせも、ひび
用法・用量
患部を清潔にしたのち、1日2～3回適量をすりこんでください。又は症状に応じてガーゼに適量を塗布して患部に貼付してください。
《用法・用量に関連する注意》
1.定められた用法・用量を守ってください。
2.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3.目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
4.本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
成分・分量(100g中)
酸化亜鉛 …… 10.0g
ジフェンヒドラミン …… 1.0g
イソプロピルメチルフェノール 1.0g
dl-カンフル …… 2.25g
添加物：d-ボルネオール、パレイショデンプン、ワセリン、パラフィン、香料
製造販売元
株式会社 雪の元 本店
奈良県橿原市大谷町182番地
お客様相談室
電話 0744-22-2440
受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00
(土、日、祝日を除く)