

1203-KYP

第3類医薬品

スキントールE

業務用

520g



トランプ
ボキ中
フィルム



【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

- ①目の周囲、粘膜等。
- ②湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】

捻挫、打撲、筋肉痛、骨折痛、関節痛、腰痛、肩こり、筋肉疲労、しもやけ

【用法・用量】

1日2～3回適量を患部に塗擦する。又は、症状に応じてガーゼに適量を塗布して患部に貼付する。

【用法・用量に関する注意】

- ①目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- ②小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ③外用にのみ使用し、内服しないでください。

【成分・分量】 (100g中)

トコフェロール酢酸エステル…0.5g d,l-カンフル…3.0g
 サリチル酸メチル…10.0g ジフェンヒドラミン…0.5g
 l-メントール…6.0g

※添加物として、セタノール、プロピレングリコール、サラシミツロウ、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ポリソルベート65、マイクロクリスタリンワックス、流動パラフィン、ラウリル硫酸Na、ユーカリ油、パラベンを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- ①直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

製造販売元 株式会社 雪の元本店 奈良県橿原市大谷町182番地 TEL0744-22-2440 製造番号



4 979949 000890