



【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと

- ①目の周囲、粘膜等。 ②湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、皮膚のあれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

捻挫、打撲、筋肉痛、関節痛、腰痛、肩こり、筋肉疲労、しもやけ

【用法・用量】

1日2～3回適量を患部に塗布する。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5) 入浴前の使用は避けてください。

【成分・分量】 (100g) 中

l-メントール……………5.0g	サリチル酸メチル……………6.0g
d,l-カンフル……………3.0g	ジフェンヒドラミン……………0.5g
トコフェロール酢酸エステル…0.5g	トウガラシエキス……………0.1g
	(原生薬 5g に相当)

※添加物として、流動パラフィン、プロピレングリコール、セタノール、サラシミツロウ、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ステアリン酸グリセリン、S Eステアリン酸グリセリル、パラフィン、ステアリン酸ポリオキシル、ジメチルポリシロキサン、ユーカリ油、キサンタンガム、パラベンを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- ①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元 株式会社 雪の元 本店

奈良県橿原市大谷町182番地 TEL 0744-22-2440 製造番号

