



□封閉

【第3類医薬品】 鎮痛・消炎剤
販売名：新サリトDNS 内容量 30g

【成分・分量】 (100g中)
 2-メソトル 3.0g d-2-カンゾル 3.0g
 トコロロ-11酸エチル 0.5g サリチル酸メチル 6.0g
 シェアソレトクソニン 0.5g トウカクソエキス 0.1g
 (厚生省5gに相当)

※添加物として、流動パラフィン、コヒンチノール、セオリール、サラシエミツロウ、ホリスエチルステアレート、モノステアリン酸コレステリル、SEステアリン酸コレステリル、パラフィン、ステアリン酸コレステリル、シメチルポリシリコン、シリカ、コウカド、キヤノクワカ、パラベンを含有する。

1.定められた用法・用量を守ってください。2.目に入らぬよう十分に注意してください。万一、目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診察を受けてください。3.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用してください。4.外用にのみ使用し、内服しないでください。5.入浴前の使用は避けてください。

【効能・効果】 腰痛、肩こり、捻挫、筋肉痛、打撲、関節痛、筋力疲労、しめやし

【用法・用量】 1日2～3回適量を患部に塗布する。
【用法・用量に関する注意】

ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

【使用上の注意】

- してはいけないこと
 (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
 次の部位には使用しないでください
 ①目の周囲、粘膜等。 ②湿疹、かぶれ、傷口。

●相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、皮膚のあれ
- 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

2205-AH

鎮痛・消炎剤
**捻挫・打撲
 肩こり・腰痛**

鎮痛・消炎剤
捻挫・打撲

新サリトDNS **温感** 第3類医薬品



30g

製造番号 使用期限

【保管及び取扱い上の注意】

1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。2.小児の手の届かない所に保管してください。3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)4.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

製造販売元 株式会社 雪の元 本店
 奈良県橿原市大谷町182番地

お客様相談室 TEL 0744-22-2440
 受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00
 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931 4

