

湿疹・かぶれ・皮膚炎に

アスゲンPVA軟膏

アンテドラッグステロイド配合

販売名
アスゲンPVA軟膏a

- アンテドラッグステロイド（患部では優れた効果を示し、体内に吸収されると低活性になる成分）であるプレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルを配合しています。
- 炎症を鎮める『プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル』に、炎症に伴うかゆみを鎮める『クロタミトン』、血行をよくする『トコフェロール酢酸エステル』、殺菌効果がある『イソプロピルメチルフェノール』を効果的に配合しました。4種の有効成分が、湿疹、かぶれ、皮膚炎などを鎮めます。
- 添加物のN-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルヘキサデカナミドは生体成分セラミドと同じような働きがあります。


■プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル配合

患部では優れた効果を示し、体内に吸収されると低活性になるアンテドラッグステロイドです。

■4種の有効成分が、湿疹、かぶれ、皮膚炎、じんましん等に効果的に作用

●炎症に	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
●かゆみに	クロタミトン
●血行を促進	トコフェロール酢酸エステル
●患部を殺菌	イソプロピルメチルフェノール

(イメージ図)



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等。

2. 顔面には、広範囲に使用しないでください

3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮 膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

《効能・効果》

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

《用法・用量》

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 本剤を塗擦後、使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

《成分・分量と働き》 1g中

成 分	分量	働 き
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	1.5mg	高い消炎作用により、湿疹・皮膚炎等の炎症を鎮めます。
クロタミトン	50mg	湿疹・かぶれ等に伴うかゆみを鎮めます。
トコフェロール酢酸エステル	5mg	血行を促進し、治療を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	1mg	殺菌効果により、患部の感染を防ぎます。

添加物として、ワセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、モノステアリン酸グリセリン、N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルヘキサデカナミドを含有します。

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。


製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社

お客様相談室

電話：03-3370-7174(代表)

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元  日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

企画開発元  アスゲン製薬株式会社
岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008

製造販売元  株式会社 雪の元 本店
奈良県橿原市大谷町182番地