

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。


外用鎮痛消炎薬

サリトロンFB ローション

特 徴

- 痛みや腫れのもとに直接作用するフェルピナクを3.0%配合した非ステロイド系の鎮痛消炎薬です。
- フェルピナクは、患部で痛みや腫れに関係する物質（プロスタグランジン）の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉の痛みにすぐれた効き目をあらわします。
- 背中、腰などの手の届きにくいところにも塗りやすい容器で、痛みの強い部位にもやさしく塗れます。
- l-メントール6.0%配合により、塗布後心地よい清涼感があります。

 使用上の注意

 **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないで下さい。

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4)15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないで下さい。

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口又は化膿している患部。

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日2～4回、適量を患部に塗布して下さい。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)定められた用法を守って下さい。
- (2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けて下さい。
- (3)外用にのみ使用して下さい。
- (4)薬剤塗布後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないで下さい。

【成分・分量】（100mL中）

成分	分量	はたらき
フェルピナク	3.0g	炎症を抑え痛みをやわらげます
l-メントール	6.0g	清涼感を与え、痛みをやわらげます
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.1g	抗ヒスタミン作用により炎症を抑えます

添加物として、プロピレングリコール、ジブチルヒドロキシトルエン、トリエタノールアミン、エタノールを含有する

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光を避け、キャップをしっかりと閉めて涼しい所に立てて保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4)本剤を火気に近づけないで下さい。また、使用後は火中に投じないで下さい。
- (5)揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかりと閉めて下さい。
- (6)メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意して下さい。
- (7)使用期限が過ぎた製品は使用しないで下さい。また、開封後は使用期限内であってもなるべく早く使用して下さい。

〔内容量〕

20mL

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡下さい。

〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地

(株)雪の元本店 お客様相談室

受付時間 9:00～12:00

13:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）

TEL.0744-22-2440 FAX.0744-22-2406

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元

株式会社プロダクト・イノベーション

富山県富山市浜黒崎239番地

製造販売元

株式会社 雪の元 本店

奈良県橿原市大谷町182番地