

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

湿疹・かぶれの治療薬

第②類医薬品

グランキサゴールドHD

- グランキサゴールドHDは、アンテドラッグステロイド(皮膚表面の患部で優れた効果を示し、体内に吸収されると作用の弱い物質に分解することで副作用が低減されるよう設計されたステロイド剤) プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルを配合した液剤です。
- ジフェンヒドラミン塩酸塩が、かゆみの元となるヒスタミンの働きを抑えます。
- グリチルレチン酸が非ステロイド性抗炎症作用により、炎症やかぶれを抑えます。
- アラントインが、組織修復作用により、肉芽形成を促進し、患部の治りをはやめます。
- イソプロピルメチルフェノールが、殺菌作用により、患部の化膿を防ぎます。
- ジブカイン塩酸塩が局所麻酔作用により、かゆみを抑えます。
- *l*-メントールのスーッとすする清涼感がかゆみをすばやく鎮めます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください
 - (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
 - (2) 創傷面、目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(裏面もご覧ください。)

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

【効 能】

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

【成分・分量】 100g中

成 分	分量	作 用
プレドニゾン 吉草酸エステル酢酸エステル (アンテドラッグステロイド剤PVA)	0.15g	抗炎症作用により、湿疹・かぶれなどによる炎症を鎮めます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.00g	抗ヒスタミン作用により、かゆみを起こすヒスタミンなどの原因物質を抑えます。
グリチルレチン酸	0.50g	非ステロイド性抗炎症作用により、炎症やかぶれを抑えます。
アラントイン	0.20g	組織修復作用により、肉芽形成を促進し、患部の治りをはやめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.10g	殺菌作用により、掻き傷による化膿を防ぎます。
ジブカイン塩酸塩	0.25g	局所麻酔作用により、かゆみを抑えます。
ℓ-メントール	4.00g	患部に清涼感を与え、かゆみを緩和します。

添加物：エタノール、プロピレングリコール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、ジブチルヒドロキシトルエン、ヒドロキシプロピルセルロース、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)メガネ、時計、アクセサリー、プラスチック類、化繊製品、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6)使用後は必ずキャップを十分にしめてください。
- (7)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても、品質保持の点からなるべく早く使用してください。

本剤についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

株式会社 雪の元本店 お客様相談室
〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地
TEL 0744-22-2440 FAX 0744-22-2406

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
☎0120-149-931 (フリーダイヤル)

発売元

小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中鷄1丁目139番地

製造販売元

株式会社 雪の元 本店
奈良県橿原市大谷町182番地