

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 外用鎮痛消炎薬

## サ-パスミンDIゲル

## 特 徴

- 痛みや腫れのもとに直接作用するジクロフェナクナトリウムを1.0%配合した非ステロイド系の鎮痛消炎薬です。
- ジクロフェナクナトリウムは、患部で痛みや腫れに関する物質(プロスタグランジン)の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉の痛みにすぐれた効き目をあらわします。
- べたつきのない爽やかな、乾きの速いゲル基剤です。
- $\ell$ -メントール3.0%配合により、心地よい清涼感があります。

## ⚠ 使用上の注意

## ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
  - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
  - (1) 目の周囲、粘膜等。
  - (2) 皮膚の弱い部位(顔、頭、わきの下等)。
  - (3) 湿疹、かぶれ、傷口。
  - (4) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください。
4. 長期連用しないでください。



## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 次の医薬品の投与を受けている人。 ニューキノロン系抗菌剤
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮膚のあれ、 <small>むくみ</small> 落屑(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の治療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎、 光線過敏症	塗擦部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身にひろがる場合があります。また、日光があたった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(裏面もご覧ください。)

## 効 能

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

## 用 法 ・ 用 量

1日3～4回適量を患部に塗擦してください。ただし、塗擦部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 15歳未満の小児に使用させないでください。
- (2) 用法・用量を厳守してください。
- (3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 1週間あたり、50gを超えて使用しないでください。
- (6) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (7) 同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。
- (8) 通気性の悪いもの(ラップフィルム、矯正ベルト等)で使用部位を覆い、密封状態にしないでください。
- (9) 使用後は手を洗ってください。

## 成 分 ・ 分 量

1g中

成 分	分 量	働 き
ジクロフェナクナトリウム	10mg	痛みの原因物質(プロスタグランジン)の生成を抑え、痛みをやわらげます。
ℓ-メントール	30mg	清涼感を与え、痛みをやわらげます。

添加物として、エタノール、プロピレングリコール、アジピン酸ジイソプロピル、グリセリン、ヒドロキシプロピルセルロース、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ピロ亜硫酸Na、乳酸を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 火気に近づけないでください。(エタノール含有物)
- (5) 揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかりと締めてください。
- (6) メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないようご注意ください。
- (7) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく早く使用してください。

本剤についてのお問い合わせは、  
お買い求めのお店または下記までご連絡ください。

株式会社 雪の元本店 お客様相談室  
〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地  
TEL 0744-22-2440 FAX 0744-22-2406

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00  
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)

発売元

小林薬品工業株式会社  
東京都中央区日本橋箱崎町40番

製造販売元

株式会社 雪の元 本店  
奈良県橿原市大谷町182番地