

肩|腰|関節の

痛みに

トリナートFB
50ml

第2類医薬品

肩|腰|関節の

痛みに

フェルピナク
3.0%配合

痛みのもとに
直接浸透

l-メントール
6.0%配合

トリナートFB
50ml

第2類医薬品

常盤薬品
NOEVIR GROUP

ご使用前に

スポンジが破れるおそれがあるため、薬液をよく浸透させてからご使用ください。



手にピッタリフィットしてぬりやすい!

よく浸す!

成分・分量 本品100mL中

- フェルピナク 3.0g
- l-メントール 6.0g
- クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.1g
- 添加物:プロピレングリコール、ジブチルヒドロキシトルエン、2,2',2"-ニトロロトリエタノール、エタノール

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

発売元 常盤薬品工業株式会社
神戸市中央区港島中町6-13-1
NOEVIR GROUP

製造 株式会社 雪の元 本店
販売元 奈良県橿原市大谷町182番地

お問い合わせは
常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室0120-875-710まで

副作用被害救済制度 0120-149-931

用法・用量

1日2~4回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。
- (4)薬剤塗布後、患部をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないでください。

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光を避け、キャップをしっかり閉めて涼しい所に立てて保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になり、品質が変わります。)
- (4)本剤を火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。
- (5)揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかり閉めてください。
- (6)メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、化繊の衣服、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質または変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
- (7)使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく早く使用してください。

火気厳禁 50mL
1,500円(税別)



第2類
医薬品

押してあける

2102-TYP
120700
YKMH102

使用に際しては、この箱の説明文を必ずお読みください。必要に応じて読むように、大切に保管してください。

トリナートFBローション(外用鎮痛消炎薬)

⚠ 使用上の注意

☒してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1.次の人は使用しないでください
(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)ぜんそくを起こしたことがある人。
(3)妊婦または妊娠していると思われる人。
(4)15歳未満の小児。
- 2.次の部位には使用しないでください
(1)目の周囲、粘膜など。(2)湿疹、かぶれ、傷口。
(3)みずむし・たむし等または化膿している患部。
- 3.長期連用しないでください

■相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

紙 : 箱

製造番号 使用期限

