

第2類医薬品

コーチレンFBゲル

ゲル剤

開ける

痒み止め成分配合



# 痛みを直接効く!

## 腰・関節・肩こり筋肉の

ケミカルミクス

セルフメディケーション

税 控除 対象

火気厳禁

株式会社ソシア お客様サービスセンター  
電話 0299-806-806  
受付時間(10~17時・月~金、祝日除く)

発売元  
株式会社ソシア  
東京都品川区  
南大井6-28-10



紙 : 箱



キャップ

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

金属 : チューブ



第2類医薬品 ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。 外用鎮痛消炎薬 販売名:コーチレンFBゲル 内容量:15g

【効能・効果】肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫  
【用法・用量】1日2~4回、適量を患部に塗布してください。《用法・用量に関する注意》(1)定められた用法を守ってください。(2)目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。(3)外用にのみ使用してください。(4)薬剤塗布後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。  
【成分・分量】(100g中)フェルピナク…3.0g、1-メントール…6.0g、クロルフェニラミンマレイン酸塩…0.1g 添加物:プロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー、ヒドロキシプロピルセルロース、エデト酸Na、ジソプロパノール、ノルアミン、エタノール  
【注意】①次の人は使用しないでください1.本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。2.ぜんそくを起こしたことがある人。3.妊婦又は妊娠していると思われる人。4.15歳未満の小児。②次の部位には使用しないでください1.目の周囲、粘膜等。2.湿疹、かぶれ、傷口。3.みずむし。たむし等又は化膿している患部。③使用が適さない場合があるので、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください④直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください⑤本剤を火気に近づけないでください⑥使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

**使用上の注意** ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

**してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- ①次の人には使用しないこと①本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。②ぜんそくを起こしたことがある人。③妊婦又は妊娠していると思われる人。④15歳未満の小児。⑤次の部位には使用しないこと  
①目の周囲、粘膜等。②湿疹、かぶれ、傷口。③みずむしたむし等又は化膿している患部。④長期連用しないこと

**相談すること**

①次の人には使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること①医師の治療を受けている人。②薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。③使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること/皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ/まれに次の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。/ショック(アナフィラキシー)：使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。④5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【保管及び取扱い上の注意】

1.直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。2.小児の手の届かない所に保管してください。3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)4.本剤を火気に近づけないでください。5.メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので付着しないように注意してください。6.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。又、開封後は期限内であってもなるべく早く使用してください。