

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

鎮痒消炎薬

かゆみ、虫さされに

スキントールクールアタック

蚊・ハチ・アリ・毛虫などの虫さされによる、かゆみや痛みをしずめるのに効果を発揮するお薬です。非ステロイドのお薬で、べたつきのないさわやかな塗り心地の液剤です。

- かゆみや痛みの原因物質を抑える抗ヒスタミン成分と、かゆみ・痛みを和らげる効果のある局所麻酔成分とのダブルの働きで、かゆみを抑えます。
- 清涼感を与える成分を2種類配合することにより、かゆみをすみやかにしずめます。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください
目の周囲、粘膜等。

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(裏面もご覧ください。)

【効能・効果】

かゆみ、虫さされ

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)塗った患部を温めないでください。
- (5)薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。また、ひざの裏やひじの内側等に使用する場合は、皮膚を密着(正座等)させないでください。
- (6)入浴や運動の前後の使用は、刺激を強く感じることがありますので、皮膚の弱い人は注意してください。刺激が強すぎる場合は、水又は石けん水で洗い流してください。
- (7)火気のそばで使用しないでください。
- (8)外用にのみ使用してください。

【成分・分量】(100mL中)

成分	分量	はたらき
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	抗ヒスタミン作用によりかゆみを抑えます。
リドカイン	1.0g	局所麻酔作用によりかゆみを抑えます。
dL-カンフル	2.0g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
l-メントール	4.0g	

添加物として、ノナン酸バニリルアミド、エタノール、エデト酸ナトリウムを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)火気に近づけないでください。また、火気のそばで保管しないでください。
- (5)メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、プラスチック類、化繊製品、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6)使用後は必ずキャップを十分にしめてください。
- (7)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

〔内容量〕20mL

本剤についてのお問い合わせは、
下記までご連絡ください。

株式会社 雪の元本店 お客様相談室
〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地
TEL 0744-22-2440 FAX 0744-22-2406

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)



(発売元)
株式会社 中京医薬品
愛知県半田市龜崎北浦町2-15-1

製造販売元
株式会社 雪の元本店
奈良県橿原市大谷町182番地