キンカン® ハイハイクリーム

15g

第3類医薬品

しっしんに　かぶれに　かゆみに

開口注意

KINKAN

セルフメディケーション
税控除対象

はじめての常備薬にも

赤ちゃんからの皮膚トラブルに

~目安 生後1か月ごろから~

ノンステロイド

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

FSC ミックス パッケージ FSC® C003630

4 987062 571005

使用期限　枠外下部に記載　製造番号

しっしん・かぶれ・かゆみに

キンカン® ハイハイクリーム

第3類医薬品

©Benesse Corporation／しまじろう 「しまじろう」は株式会社ベネッセコーポレーションの登録商標です。

MADE IN JAPAN　2302-AHI 002A

効能又は効果■湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しも焼け、虫さされ、じんましん

用法及び用量■1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

(1)定められた用法・用量を守ってください。なお、お肌の状態にあわせてご使用ください。

(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3)目に入らないようご注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯でよく洗い流してください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

(4)口に入らないようご注意してください。万一、口に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うか、口の中の薬剤を拭き取ってください。しばらく様子を見て、異常がある場合には医師の診療を受けてください。

(5)外用にのみ使用してください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬にまたはアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくなり始まらない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

使用上の注意

保管及び取扱い上の注意■
(1)小児の手の届かない所に保管してください。
(2)直射日光の当たらない涼しい所に密栓し、保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になることや品質が変わることを防ぐため。)
(4)使用期限を過ぎて使用しないでください。
(5)開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用してください。

成分・分量■1回0.5g中

成　分	分　量
ジフェンヒドラミン塩塩	2.00g
グリチルリチン酸二カリウム	0.50g
アラントイン	0.20g
イソプロピルメチルフェノール	0.60g
トコフェロール酢酸エステル	0.50g

素肌触れ1. 3-ブチレングリコール、トリメチルグリシン酸グリセリン、ステアロイルグルタミン酸ジエタノールアミン、ステアリルアルコール、ステアリン酸、自己乳化型ステアリン酸グリセリル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カルボキシビニルポリマー、シクロメチコン、ヒドロキシエチルセルロース、香料、BG、EDTA-2Na、メチルパラベン、プロピルパラベン

お問合せ先■
株式会社 金冠堂
TEL 03-3421-6171(代表)
受付時間 9:00~16:00 月~金(祝日を除く)

消費者相談窓口■
株式会社 金冠堂
〒134-0023 東京都世田谷区井口目18番10号

発売元
株式会社 壽の元 本店
奈良県橿原市大谷町182番地

製造販売元

無断転載禁止

ご使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品　15g

しっしん・かぶれ・かゆみに

キンカン® ハイハイクリーム

販売名：キンカンハイハイクリーム

〈外用鎮痒消炎剤〉