

ゲル

50g

ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェン

+l-メントール配合



セルフメディケーション  
税 控 除 対 象

第2類医薬品

ロアメタシンLXクールゲル

ゲル

50g

ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェン

+l-メントール配合

肩・腰・関節のつらい痛み

痛みの元  
に直接浸透



のびがよく、ベタつかない  
ゲルタイプ

日 目 年

使用開始日  
を記入してください

開封口

肩・腰・関節のつらい痛み

痛みの元  
に直接浸透

第2類医薬品

鎮痛消炎剤

販売名:

ロアメタシンLXクールゲル

【効能・効果】

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)

【用法・用量】

1日3~4回、適量を患部に塗布してください。

《用法・用量に関連する注意》

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (4)1回あたり約2g(約8cm)、1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- (5)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (6)外用にのみ使用してください。
- (7)使用後は手を洗ってください。



4 987487 104659

【成分・分量】(100g中)

ロキソプロフェンナトリウム水和物.....1.13g

(無水物として1g)

l-メントール.....3.00g

添加物: アジピン酸ジイソブロピル、ヒプロメロース、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、エタノール、pH調節剤

【保管及び取扱い上の注意】

- 1.高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4.火気に近づけないでください。
- 5.本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにしてください。
- 6.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。又、開封後は期限内であっても品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

副作用被害救済制度  
(独)医薬品医療機器総合機構  
電話 0120-149-931  
(フリーダイヤル)

製造販売元

株式会社 雪の元本店  
奈良県橿原市大谷町182番地

株式会社 雪の元本店 お客様相談室

電話 0744-22-2440

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00  
(土、日、祝日を除く)



使用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1.次の人は使用しないでください

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。(3)15歳未満の小児。

2.次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等 (2)皮膚の弱い部位(顔、わきの下等) (3)しっしん、かぶれ、傷口 (4)みずむし・たむし等又は化膿している患部

3.本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください

4.連続して2週間以上使用しないでください

(本剤は痛みを一時的に抑えるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください)

☒ 相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3)妊娠又は妊娠していると思われる人 (4)高齢者 (5)次の診断を受けた人 気管支ぜんそく

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状                            |
|------|--------------------------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、色素沈着 |
| 消化器  | 胃部不快感、みぞおちの痛み                  |
| その他  | むくみ                            |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称              | 症 状                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |

3.使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢・軟便

4.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (他の疾患の可能性あります)

2501-AHI

製造番号 使用期限