

第3類医薬品

肩こり・腰痛・筋肉痛・うちみ・ねんざ


クールピップE

クミアイ湿布薬

のび～る のび～る

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

フィルムの上手なはがし方



ビタミンE配合

伸縮性 6枚入



発売元

北海道厚生農業協同組合連合会
札幌市中央区北4条西1丁目1番地 TEL011-232-6536

開封後はチャックを軽く押さえて閉めてください。

キリトリ線

クールピップE 第3類医薬品

外用消炎鎮痛薬

【特長】

- ビタミンE酢酸エステル(トコフェロール酢酸エステル)が血行を改善し、消炎・鎮痛薬の働きを助けます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

腰痛、打撲、ねんざ、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

品目番号 257-158

(12cm×8cm×6)

【使用法】

表面のフィルムをはがし、1日1～2回直接患部に貼ってください。

必要に応じて包帯などで固定してください。

＜使用法に関連する注意＞

1. 定められた使用法を守ってください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

【有効成分】膏体100g(1037cm²)中の成分
サリチル酸メチル……………1.2g
dl-カンフル……………1.0g
l-メントール……………0.8g
トコフェロール酢酸エステル……………0.3g
添加物として、ポリソルベート80、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、濃グリセリン、カルメロースナトリウム、タルク、pH調整剤、酸化チタン、乾燥水酸化アルミニウムゲル、ポリアクリル酸部分中和物、その他2成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
 2. 小児の手の届かない所に保管してください。
 3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
 4. 開封後は、チャックを密閉し保管してください。
 5. 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 製造販売元 リードケミカル株式会社 富山市日俣77-3
お客様相談窓口 電話 076-425-1978
(土、日、祝日を除く9:00～17:00)

