

サリチル酸系鎮痛消炎剤配合

第3類医薬品

# エルデ<sup>®</sup>温パップ

肩こり・腰痛・筋肉痛に…


6枚入

リードケミカル株式会社



副作用被害救済制度  
電話:0120-149-931

フィルムの上手なはがし方



開封後はチャックを軽く押さえて閉めてください。

## エルデ<sup>®</sup>温パップ<sup>®</sup> 第3類医薬品 外用消炎鎮痛薬

【特長】

- トウガラシエキスの温感成分が、局所の血行を促進する一方、消炎、鎮痛成分が皮膚より容易に吸収され、こりや痛みにも効果的に作用します。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

#### 🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

打撲、ねんざ、肩こり、腰痛、筋肉痛、関節痛、骨折痛、筋肉疲労、しもやけ

品目番号 257-161 (12cm×8cm×6) **¥800+税**

【用法・用量】

表面のフィルムをはがし、1日1～2回直接患部に貼ってください。必要に応じて包帯などで固定してください。

<用法・用量に関連する注意>

1. 定められた使用方法を守ってください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 患部の広さ、状態に応じて、フィルムの上から適当な大きさに切ってお使いください。
4. 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
5. 入浴する場合は1時間前にはがしてください。

【成分・分量】 膏体100g (1037cm<sup>2</sup>)中

サリチル酸メチル ..... 1.0g  
 Q-メントール ..... 0.2g  
 トウガラシエキス-20 (日局トウガラシ1.0gに相当) ... 0.02g  
 添加物として、トコフェロール、ポリソルベート80、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、濃グリセリン、カルメロースナトリウム、タルク、pH調整剤、酸化チタン、乾燥水酸化アルミニウムゲル、ポリアクリル酸部分中和物、黄色5号、その他2成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 開封後は、チャックを密閉し保管してください。
5. 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 **リードケミカル株式会社** 富山市日俣77-3

お客様相談窓口 電話 **076-425-1978**

(土、日、祝日を除く9:00～17:00)



↑キリトリ線 ↓キリトリ線