

キリトリ線




インドメタシン配合

経皮吸収型鎮痛消炎パップ剤

ツライ痛みによく効く

フィルムの上手なはがし方



第2類医薬品

エルデパップID

6枚入

リードケミカル株式会社

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

開封後はチャックを軽く押さえて閉めて下さい。

エルデパップID 第2類医薬品

使用上の注意

- してはいけないこと**
 - (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
 - 1. 次の人は使用しないで下さい
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
 - 2. 次の部位には使用しないで下さい
 - (1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
 - 3. 長期連用しないで下さい
- 相談すること**
 - 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関連部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

【効能・効果】
肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【使用法】
表面のライナーをはがし、1日1~2回直接患部に貼って下さい。必要に応じて包帯などで固定して下さい。

- <使用法に関連する事項>
- 1. 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- 2. 11歳未満の小児に使用させないで下さい。
- 3. 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。
- 4. 連続して2週間以上使用しないで下さい。

【有効成分】膏体100g(1077cm²)中の成分
インドメタシン 0.375g
添加物として、ポリソルベート80、濃グリセリン、カルメロースナトリウム、タルク、pH調整剤、ℓ-メントール、酸化チタン、乾燥水酸化アルミニウムゲル、ポリアクリル酸部分中和物、マクロゴール、その他3成分を含有する。

- 【保管及び取扱い上の注意】**
- 1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- 2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 3. 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4. 開封後は、チャックを密閉し保管して下さい。

製造販売元 リードケミカル株式会社 富山市日俣77-3
お客様相談窓口 電話 076-425-1978
(土、日、祝日を除く9:00~17:00)
品目番号 257-157 ¥700+税 (12cm×8cm×6)

