

キリトリ線

鎮痛消炎剤+ビタミンE配合

# エルデプラスE

肩こり 腰痛 筋肉痛

伸縮性

6枚入 第3類医薬品

リードケミカル株式会社

開封後はチャックを軽く押さえて閉めて下さい。

## エルデプラスE 第3類医薬品 外用消炎鎮痛薬

### ▲ 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと**  
 (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
 次の部位には使用しないで下さい  
 (1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

**👤 相談すること**  
 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

**【効能・効果】**  
 腰痛、打撲、ねんざ、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛  
 品目番号 257-155

[12cm×8cm×6] **¥600+税**  
 副作用被害救済制度の問合せ先  
 (独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

**【使用法】**  
 表面のフィルムをはがし、1日1～2回直接患部に貼って下さい。  
 必要に応じて包帯などで固定して下さい。  
**<使用法に関連する注意>**  
 1. 定められた使用法を守って下さい。  
 2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。

**【有効成分】 膏体100g(1037cm<sup>2</sup>)中の成分**  
 サリチル酸メチル……………1.2g  
 d0-カンフル……………1.0g  
 0-メントール……………0.8g  
 トコフェロール酢酸エステル……………0.3g  
 添加物として、ポリソルベート80、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、濃グリセリン、カルメロースナトリウム、タルク、pH調整剤、酸化チタン、乾燥水酸化アルミニウムゲル、ポリアクリル酸部分中和物、その他2成分を含有する。

**【保管及び取扱い上の注意】**  
 1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。  
 2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。  
 3. 他の容器に入れ替えないで下さい。  
 (誤用の原因になったり品質が変わります。)  
 4. 開封後は、チャックを密閉し保管して下さい。  
 5. 配置期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。  
 製造販売元 リードケミカル株式会社 富山市日俣77-3  
 お客様相談窓口 電話 076-425-1978  
 (土、日、祝日を除く9:00～17:00)

