

(きりとり線)



開封後は、袋の口を折り曲げて保管してください。

第3類医薬品

HOT TYPE

外用剤

### 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 開封後は、開封口を折り曲げて保管してください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

新リード温パップ  
(14cm×10cm)×5枚

## 新リード温パップ

外用消炎鎮痛薬

第3類医薬品

### 【特長】

- トウガラシエキスの温感成分が、局所の血行を促進する一方、消炎、鎮痛成分が皮膚より容易に吸収され、こりや痛みにも効果的に作用します。
- 伸びのよい特殊な不織布を使用していますので、ひじやひざなどの関節部分の動きにもピッタリフィットします。
- はがすとき痛みがなく、はがした後皮膚に汚れが残らず、使用後がさわやかです。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の部位には使用しないでください  
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

#### 🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

### 【使用法】

表面のフィルムをはがし、1日1～2回直接患部に貼ってください。必要に応じて包帯などで固定してください。

<使用法に関連する注意>

1. 定められた使用法を守ってください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 患部の広さ、状態に応じて、フィルムの上から適当な大きさに切ってお使いください。
4. 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
5. 入浴する場合は1時間前にはがしてください。

### 【有効成分】膏体100g(1000cm<sup>2</sup>)中の成分

サリチル酸メチル.....1.0g  
 Q-メントール.....0.2g  
 トウガラシエキス-20(日局トウガラシ1.0gに相当).....0.02g  
 添加物として、トコフェロール、ポリソルベート80、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、濃グリセリン、カルメロースナトリウム、タルク、pH調整剤、酸化チタン、乾燥水酸化アルミニウムゲル、ポリアクリル酸部分中和物、黄色5号、その他2成分を含有する。

製造販売元 **リードケミカル株式会社** 富山市日俣77-3  
 お客様相談窓口 電話 076-425-1978  
 (土、日、祝日を除く9:00～17:00)

副作用被害救済制度の問合せ先  
 (独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

