

(きりとり線)



開封後は、袋の口を折り曲げて保管してください

第3類医薬品

COOL TYPE

外用剤

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 開封後は、開封口を折り曲げて保管してください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

新リードパップ
(14cm×10cm)×5枚

新リードパップ

外用消炎鎮痛薬

第3類医薬品

【特長】

- 打撲、ねんざなどの急性炎症で、熱感があるときも、水分を含む基剤の湿布効果で適度な冷感が保たれ、有効成分の働きを助けます。
- 伸びのよい特殊な不織布を使用していますので、ひじやひざなどの関節部分の動きにもピッタリフィットします。
- はがすとき痛みがなく、はがした後皮ふに汚れが残らず、使用後がさわやかです。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【使用法】

表面のフィルムをはがし、1日1～2回直接患部に貼ってください。
必要に応じて包帯などで固定してください。

<使用法に関連する注意>

1. 定められた使用法を守ってください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 患部の広さ、状態に応じて、フィルムの上から適当な大きさに切ってお使いください。

【有効成分】膏体100g(1000cm²)中の成分

サリチル酸メチル.....1.5g
 dl-カンフル.....1.0g
 l-メントール.....0.8g
 添加物として、ポリソルベート80、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、濃グリセリン、カルメロースナトリウム、タルク、pH調整剤、酸化チタン、乾燥水酸化アルミニウムゲル、ポリアクリル酸部分中和物、その他2成分を含有する。

製造販売元 **リードケミカル株式会社** 富山市日俣 77-3
 お客様相談窓口 電話 076-425-1978
 (土、日、祝日を除く 9:00～17:00)

副作用被害救済制度の問合せ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



(きりとり線)



開封後は、袋の口を折り曲げて保管してください

第3類医薬品

COOL TYPE

外用剤

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 開封後は、開封口を折り曲げて保管してください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

新リードパップ
(14cm×10cm)×6枚

新リードパップ

外用消炎鎮痛薬

第3類医薬品

【特長】

- 打撲、ねんざなどの急性炎症で、熱感があるときも、水分を含む基剤の湿布効果で適度な冷感が保たれ、有効成分の働きを助けます。
- 伸びのよい特殊な不織布を使用していますので、ひじやひざなどの関節部分の動きにもピッタリフィットします。
- はがすとき痛みがなく、はがした後皮ふに汚れが残らず、使用後がさわやかです。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

⊗ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【使用法】

表面のフィルムをはがし、1日1～2回直接患部に貼ってください。
必要に応じて包帯などで固定してください。

<使用法に関連する注意>

1. 定められた使用法を守ってください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 患部の広さ、状態に応じて、フィルムの上から適当な大きさに切ってお使いください。

【有効成分】膏体100g(1000cm²)中の成分

サリチル酸メチル.....1.5g
 d0-カンフル.....1.0g
 g-メントール.....0.8g
 添加物として、ポリソルベート80、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、濃グリセリン、カルメロースナトリウム、タルク、pH調整剤、酸化チタン、乾燥水酸化アルミニウムゲル、ポリアクリル酸部分中和物、その他2成分を含有する。

製造販売元 **リードケミカル株式会社** 富山市日俣 77-3
 お客様相談窓口 電話 076-425-1978
 (土、日、祝日を除く9:00～17:00)

副作用被害救済制度の問合せ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

