

# 生薬ベラドンナエキス+ビタミンEエステル配合



**伸縮性**

第3類医薬品

外用消炎鎮痛薬

# MARONAPAP BE

マロナパップBE

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

## 消炎・鎮痛パップ剤 マロナパップBE (14cm×10cm) 5枚入

第3類医薬品

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

#### 🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

#### 【効能又は効果】

腰痛、打撲、ねんざ、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

#### 【使用方法】

表面のフィルムをはがし、1日1~2回直接患部に貼って下さい。必要に応じて包帯などで固定して下さい。

#### <使用法に関連する注意>

- 定められた使用法を守って下さい。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。

#### 【有効成分】膏体100g(1037cm<sup>2</sup>)中の成分

ベラドンナエキス ..... 0.2g  
サリチル酸グリコール ..... 1.0g  
トコフェロール酢酸エステル ..... 0.3g  
Q-メントール ..... 0.5g  
添加物として、ポリソルベート80、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、濃グリセリン、カルメロースナトリウム、タルク、pH調整剤、酸化チタン、乾燥水酸化アルミニウムゲル、エデト酸ナトリウム水和物、ポリアクリル酸部分中和物、香料、その他2成分を含有する。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 開封後は、開封口を折り曲げて保管して下さい。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

#### 【お問い合わせ先】

製造販売元 リードケミカル株式会社 富山市日俣 77-3  
お客様相談窓口 電話 076-425-1978  
(土、日、祝日を除く 9:00~17:00)

開封後は、袋の口を折り曲げて保管して下さい  
(きりとり線)