

使用前にこの説明書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう保管すること。

販売名：メンソレータムフレディメディカルクリームn

ジフェンヒドラミンの抗ヒスタミン作用でかゆみを抑えます。

第2類医薬品

鎮痒消炎薬



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)次の部位には使用しないこと。目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等



相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)湿潤やただれのひどい人(4)妊婦又は妊娠していると思われる人 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

■**効能・効果** かゆみ、かぶれ、皮フ炎、湿疹、ただれ、じんましん、あせも、虫さされ、しもやけ

■**用法・用量** 1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2)目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(3)外用にのみ使用すること。

■**成分・分量**(100g中)リドカイン 2.0g、ジフェンヒドラミン 1.0g、グリチルリチン酸二カリウム 1.0g、トコフェロール酢酸エステル 0.5g、イソプロピルメチルフェノール 0.1g 添加物：ヒアルロン酸 Na、グリセリン、セタノール、ステアリン酸、パラフィン、パルミチン酸イソプロピル、オレフィンオリゴマー、1,3-ブチレングリコール、タルク、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、乳酸セチル、カルボキシビニルポリマー、ジメチルポリシロキサン、ステアリン酸グリセリン、乳酸、エデト酸 Na、パラベン、香料

■保管及び取扱上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かないところに保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。

お問合せ先

コミュニケーションコール

0120-280-610

受付時間/9:00～17:00(土、日、祝除く)

(女性スタッフが対応いたします。)

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1