



メンソレータム[®]
AD

あせもの治療薬

つらいかゆみをすばやく抑え、さらっと爽快に治します。

あせものは子供にのみ
できるもの
と思っていませんか？

“あせも”は、大量に汗をかいたときに体内の汗がうまく排出されず、汗の通り道である汗管がつまりてしまい、汗が皮膚の中にたまってしまうことが原因で起こります。汗をかくことでできる“あせも”は、実は、大人にもできるのです。
そんなあせもに、「メンソレータム[®]AD ソフト」。
かきむしってひどくなる前にしっかり治療。
すっと治して、長引かせない！

あせも・かぶれに効く6つの有効成分

グリチルリチン酸二カリウム

赤み・炎症を抑えます。

ジフェンヒドラミン
かゆみの元であるヒスタミン
の作用を止めます。

クロタミトン
かゆみをすばやく、
しっかり止めます。

β-メントール
爽やかな清涼成分で
かゆみを鎮めます。

イソプロピルメチルフェノール

荒れた患部を消毒・殺菌し、
雑菌の繁殖をおさえます。

すっと治す

早めにケアして、
長引かせない

トコフェロール酢酸エステル

血行を促進し、
患部の修復を促進します。

こんな症状にも…

汗ばむ季節の…



下着・衣服のしめつけなどによる
くつきりかぶれ・かゆみ



アクセサリーによる
かぶれ・赤み

べたつかない
クリーム

- 肌になじみやすく、伸ばしやすい。
- さらっとした使用感
- 白残りせず衣服を汚しにくい。

小さなお子さまにも

- 無香料・無着色
- ステロイド剤は配合していません。



使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

鎮痒消炎薬 [販売名] メンソレータム® ADソフト

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1.次の部位には使用しないでください。

(1)目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等 (2)傷のあるところ



相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3)湿潤やただれのひどい人

2.使用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果 あせも、かゆみ、かぶれ、湿疹、皮フ炎、ただれ、じんましん、虫さされ、しもやけ

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関する注意】

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗つてください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(3)外用にのみご使用ください。

成分・作用(1g中)

有効成分	配合量	作用
ジフェンヒドラミン	10mg	かゆみの元であるヒスタミンの作用を止めます。
クロタミトン	20mg	かゆみをすばやく、しっかりと止めます。
グリチルリチン酸二カリウム	10mg	赤み・炎症をおさえます。
イソプロピルメチルフェノール	1mg	荒れた患部を消毒・殺菌し、雑菌の繁殖をおさえます。
β-メントール	10mg	爽やかな清涼成分でかゆみを鎮めます。
トコフェロール酢酸エステル	5mg	血行を促進し、患部の修復を促進します。

添加物として、スクワラン、グリセリン、パルミチン酸イソプロピル、流動パラフィン、ポリソルベート60、セタノール、カルボキシビニルポリマー、ジメチルポリシロキサン、トリエタノールアミン、ステアリン酸ソルビタン、パラベン、キサンタンガム、エデト酸Naを含有する。
ステロイド成分を配合していません。

保管及び取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
(4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く
ご使用ください。

お問い合わせ先: お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

401274801