

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。



メンソレータム® メディックイック®PRO

軟膏

湿疹・かぶれ・かゆみの治療薬

販売名:メンソレータム®
メディックイック®プロ
軟膏

第2類医薬品

9つの有効成分配合で、赤みを伴う湿疹や かぶれ、皮ふ炎などの、かきむしりたいかゆみを すばやくしずめるステロイド外用剤です。

アンテドラッグ型
ステロイド

(プレドニゾン吉草酸
エステル酢酸エステル)

+

スーッとクールにかゆみをしずめる清涼成分 dl-カンフル、l-メントール

かゆみを抑える:ジフェンヒドラミン、リドカイン

炎症をしずめる:グリチルレチン酸

荒れた肌の修復:アラントイン

血行を促進:トコフェロール酢酸エステル

殺菌:イソプロピルメチルフェノール

【アンテドラッグ型ステロイドとは】患部でよく効き体内で分解する、治療効果と安全性の両立を目的として開発された抗炎症成分です。プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルは、OTC医薬品の中では中間の「ミディアム」の強さに分類されるステロイド成分です。

弱

ウィーク

ミディアム

ストロング

ベリー
ストロング

ストロングスト

強

OTC医薬品

医療用医薬品のみ


こんな症状にお使いいただけます



湿疹

かぶれ

かゆみ



じんましん

あせも

虫さされ

以下のような部位へのご使用は
おやめください



目や目の周囲、口唇などの
粘膜や顔面の広範囲



水痘、みずむし、たむし、
化膿している患部

治療のコツ

こまめに塗る

特にお薬が落ちやすい部位(手・腕など)には
一日数回塗り直すとお効果的です。

就寝時にじっくり


患部を休めることができ、お薬もとれにくいから、
おやすみ前のご使用は有効です。

使い方のアドバイス

患部全体を覆うようにお薬をやさしくのばしててください。

擦りこまず乗せるように塗ると、湿疹部分にきちんとお薬がつきます。

※小児に使用させる場合には保護者の指導監督のもとに使用させていただきます。



- ・症状が改善するのにともない、使用回数を減らしていきましょう。
- ・症状が治りにくい時、また、慢性的に症状をぶりかえす方は、医師に相談されることをおすすめします。

してはいけないこと 

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部
 - (2) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等
2. 顔面には広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。

相談すること 

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮フ (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

■効能・効果 湿疹、かぶれ、かゆみ、皮フ炎、じんましん、あせも、虫さされ

■用法・用量 1日数回、適量を患部に塗ってください。

●用法・用量に関連する注意

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみご使用ください。

■成分・分量(1g中)

プレドニゾン 吉草酸エステル 酢酸エステル 1.5mg、ジフェンヒドラミン 10mg、リドカイン 10mg、グリチルレチン酸 5mg、アラントイン 2mg、イソプロピルメチルフェノール 1mg、トコフェロール酢酸エステル 10mg、dl-カンフル 1mg、l-メントール 15mg

添加物として、ワセリン、ゲル化炭化水素、パラフィン、セバシン酸ジエチル、ステアリン酸グリセリン、流動パラフィンを含有する。

■保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに届きたい」サポートデスクです。
東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO **ロート製薬株式会社**
 大阪市生野区巽西1-8-1