

[使用に際しては、この説明文を必ずお読みください。]

⚠️ **〈使用上の注意〉**

☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の部位には使用しないでください。  
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

■ 相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(3) 湿潤やただれのひどい人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〈効能・効果〉 腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

副作用被害救済制度 TEL.0120-149-931

# 外用鎮痛消炎薬



430g

第3類医薬品

〈特徴〉 メンタームQ軟膏Nには、浸透性をもった消炎鎮痛成分「サリチル酸メチル」が含まれ、皮下の血管に浸透して、痛みをしずめます。また、清涼感があり、局所を刺激し、知覚を鈍麻させて痛みやかゆみをやわらげる成分「l-メントール」も含まれています。

さわやかなにおいのある親水性の白色軟膏ですから、べとついたり衣服をよごすことは少なく、また、使用していることが外部からわかりません。

〈用法・用量〉 1日数回、患部に塗擦するか、または布片にのばして貼付してください。

株式会社 近江兄弟社 お客様相談室 電話 0748-32-3135

製造販売元

株式会社近江兄弟社

滋賀県近江八幡市魚屋町元29



キャップ:PP  
容器、中栓:PE  
フィルム:PET

〈用法・用量に関する注意〉 (1) 定められた用法を守ってください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。(4) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。(5) 本剤は外用にのみ使用してください。(6) お風呂上りのご使用は一層効果的ですが、やや刺激が強くなりますのでご注意ください。

〈成分・分量〉 本品100g中: サリチル酸メチル 12.0g, l-メントール 6.0g  
添加物として、ユーカリ油、テレビン油、ステアリン酸、ステアリルアルコール、モノステアリン酸グリセリン、セチル硫酸ナトリウム、プロピレングリコール、2,2',2"-ニトリロトリエタノール、カルボキシビニルポリマーを含有する。

〈保管及び取扱い上の注意〉 (1) 高温・直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。



製造番号

使用期限