

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

頭皮などのかゆみをすばやく止める
かゆみ・湿疹治療薬

第2類医薬品
鎮痒消炎剤

近江兄弟社® メンタム スカプルH

(販売名) 近江兄弟社メンタムスカプルH

抑えられない頭皮のかゆみに

抑えられない頭皮のしつこいかゆみは、シャンプーやヘアカラー、整髪料によるかぶれ、頭皮の乾燥、汗・皮脂の過剰な分泌、紫外線などさまざまな原因により起こる炎症が原因。炎症が原因で起こる頭皮のかゆみには、かゆみの元となる炎症を鎮め、すばやくかゆみを抑えることが大切です。

特長

近江兄弟社メンタムスカプルHは、6つの有効成分を配合し、頭皮などのかゆみ・湿疹、かぶれにすぐれた効果を示す治療薬です。

- 炎症成分のプレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(アンテドラッグステロイド剤PVA)が、かゆみの元となる炎症を鎮めます。
- かゆみ止め成分と清涼成分がすばやくかゆみを抑えます。
- ベタつかず垂れにくい透明のローション剤です。
- ほんのりローズの香りです。
- 手を汚さず、患部に直接塗るピンポイント容器。

※アンテドラッグステロイドとは、患部ですぐれた抗炎症作用を発揮し、その後、体内に吸収されると低活性物質に変わるステロイド剤です。有効性と安全性のバランスにすぐれた成分です。

⚠ (使用上の注意)

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむしたむし等又は化膿している患部。
 - (2) 創傷面、目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむしたむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果 湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈使用方法〉

キャップを上に向けて開け、容器の先端ノズルを患部に軽く押し当てて塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医等の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】(100mL中)

成分	分量	はたらき
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0.15g	アンテドラッグ型抗炎症成分で、高い消炎作用により、湿疹、皮膚炎等の炎症をおさえます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	1.0g	抗ヒスタミン作用により、かゆみや炎症をおさえます。
トメントール	2.0g	清涼感を与え、かゆみをやわらげます。
アラントイン	0.2g	荒れた肌の修復を助けます。
パンテノール	1.0g	肌の正常なはたらきを助けます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。

添加物として、エタノール、プロピレングリコール、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、エデト酸Na水和物、ジブチルヒドロキシトルエン、香料、クエン酸、クエン酸Na水和物を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 高温をさげ、直接日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) 液がたれないように注意して使用してください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。
- (8) 本剤はアルコール類を含むため、メガネ、時計、アクセサリー類、プラスチック類、繊維製品、皮革製品、寝具、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (9) 液もれを防ぐため、使用后は必ずキャップを十分に閉めてください。
- (10) 染めた髪につくと色落ちすることがあります。

【内容量】15mL

お問い合わせ先
株式会社 近江兄弟社 お客様相談室
TEL. 0748-32-3135
受付時間：午前 8：30 から午後 5：30 まで
(土、日、祝日を除く)

製造販売元 株式会社 近江兄弟社
滋賀県近江八幡市魚屋町元29