

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

外用鎮痛消炎薬

第2類医薬品

ラッシュピードZ

■特徴

- ラッシュピードZは、痛みやはれのもとに直接作用するフェルピナクを3%配合した非ステロイド系の鎮痛消炎薬です。
- フェルピナクは、患部で痛みや腫れに関係する物質（プロスタグランジン）の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉の痛みにすぐれた効き目をあらわします。
- 背中、腰などの手の届きにくいところにも塗りやすい容器で、痛みの強い部位にもやさしく塗れます。
- l*-メントール6%配合により、塗布後心地よい清涼感があります。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 15才未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) 化膿している患部。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 1週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、関節痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）

【用法・用量】

1日2～4回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 15才未満の小児に使用させないでください。
- (2) 定められた用法・用量を守ってください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

【成分・分量】（100mL中）

成分	分量	はたらき
フェルピナク	3g	炎症を抑え痛みをやわらげます。
ℓ-メントール	6g	清涼感を与え痛みをやわらげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.1g	炎症を抑えます。

添加物として、1,3-ブチレングリコール、トコフェロール酢酸エステル、エタノール、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直接日光の当たらない涼しい所にキャップをしっかりとめて、立てて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4) 火気に近づけないでください。また、使用済みの容器は火中に投じないでください。
- (5) メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
- (6) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。

火気厳禁

第二石油類 水溶性 危険等級Ⅲ

（エタノール、トリエタノールアミン、1,3-ブチレングリコール、トコフェロール酢酸エステル）

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願いします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎ (06) 6351-2100（代表）（午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く）