

ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名 PVAアルファEXゲル 第②類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

- (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
(2) 創傷面、目の周囲、口唇、粘膜等。

2. 顔面には、広範囲に使用しないこと

3. 長期連用しないこと

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 患部が広範囲の人。(5) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 虫さされ、かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布すること。

用法・用量に関連する注意

(1) 定められた用法・用量を厳守すること。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(4) 外用にのみ使用すること。(5) 塗布後、その部位をラップフィルム、絆創膏などの通気性の悪いもので覆わないこと。

※ 擦り込むように塗ると、ゲルが固まり肌から剥がれることがあります。また、本剤の特性上、塗擦したゲルが透明な膜状となることがありますが、配合されている添加物由来のもので、薬剤の有効性、安全性には影響ございません。

成分に関連する注意

本剤はアルコールを含んでいるので、塗布時にしみることもある。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わるのを防ぐため) (4) **火気**に近づけないこと。また、使用後は火中に投じないこと。(5) 揮発性があるので、使用後はキャップをしっかりと締めること。(6) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと。(7) メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、衣類、プラスチック類、皮革製品、床や家具などの塗装面などに付着すると変質又は変色する場合があるので、付着しないように注意すること。(8) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用すること。

成分・分量 100g中

アリドニソロン吉草酸エステル酢酸エステル0.15g、ジフェンヒドラミン塩酸塩2.0g、クロタミトン5.0g、グリチルリチン酸ニカリウム0.3g、トメントール3.5g、dl-カンフル1.0g、リドカイン2.0g、イソプロピルメチルフェノール0.1g、パンテノール1.0g、サリチル酸グリコール1.0g、トコフェロール酢酸エステル0.1g
添加物: 1,3-ブチレンジオール、ヒドロキシエチルセルロース、疎水化ヒドロキプロビルメチルセルロース、BHT、エタノール、pH調整剤

火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ
エタノール含有物 水溶性



キャップ: PP
金属: チューブ

使用
期限

製造
番号

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

4 987037 671624

口
封
部

奥田製薬 お客様相談窓口
電話 06-6351-2100 (代表)
受付時間 9:00～17:00 (土日祝日を除く)

製造販売元

奥田製薬株式会社
大阪府北区天満1丁目4番5号
https://www.okudaseiyaku.co.jp/