

- ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
- また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。
- 使用期限（容器底面および外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。

第2類医薬品

インドメタシン配合製剤

# 奥田家下呂膏ID液

## 特長

- 有効成分が痛みの元にすばやく浸透し、つらい痛みに効果的です。
- 手軽に患部に塗ることができ、のびがよく、ベタつきません。
- 柚子のほのかな香りで、目立たず、人前でも安心です。

ご注意：この製品は外用専用です。飲用しないようご注意ください。



## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の人には使用しないこと
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - ぜんそくを起こしたことがある人
- 次の部位には使用しないこと
  - 目の周囲、粘膜など
  - 湿疹、かぶれ、傷口
  - みずみし・たむしなど、又は化膿している患部
- 長期運用しないこと



### 相談すること

- 次の人には使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊娠又は妊娠していると思われる人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

腰痛、関節痛、打撲、捻挫、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、肩こりに伴う肩の痛み

## 用法・用量

1日4回を限度として患部に適量塗布する。

### [用法・用量に関する注意事項]

- 目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、症状の重い場合には眼科医の診察を受けること。
- 11歳未満の小児に使用させないこと。
- 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。
- 外用のみに使用し内服しないこと。
- 塗布部位をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないこと。
- 1週間あたり50mLを超えて使用しないこと。
- 皮膚の特に弱い方は、同じところに続けて塗布しないこと。
- 同じ部位に他の外用剤との併用は避けること。

## 成分・分量 (100g中)

成分	含量	はたらき
インドメタシン	1000mg	非ステロイド性の鎮痛消炎成分で、筋肉の痛みをとります。
β-メントール	3000mg	患部の血行・炎症を改善し、痛みをやわらげます。

添加物としてビタミンC、ビタミンE酢酸エチル、クエン酸Na、イソプロパノール、クロタミトン、水酸化Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、アジピン酸ジソプロピル、EHT、香料を含みます。

## 保管および取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。
- 小児の手のとどかないところに保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり、品質が変わること）。
- 火気に近づけないこと。
- 金属類、化織の衣類、プラスチック類、メガネ、床や家具などの塗装面等に液が付着すると変質せざることがあるので、付着しないように注意すること。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないこと。
- 本剤が衣類や寝具などに付着し、汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落とすこと。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い致します。  
お客様相談室 ☎ 0120-78-2238 (通話料無料)  
0576-25-2238 (携帯・公衆電話からの利用)  
(受付時間：月～金 (祝日を除く) 9:00～17:00)  
ホームページ [www.geroko.co.jp](http://www.geroko.co.jp)

製造販売元

株式会社 奥田又右衛門膏本舗

〒509-2201 岐阜県下呂市東上田552-1

「下呂膏」は奥田又右衛門膏本舗の登録商標です。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (通話料無料)