




# コリメタシン1%液

インドメタシン配合鎮痛消炎薬

## 特 徴

- 痛みをおさえるインドメタシンを主成分とする外用の鎮痛消炎薬です。成分が直接皮膚から患部に浸透し、すぐれた効果を発揮します。
- 運動後や疲労時における筋肉、関節、腰などの局所の痛みをおさえます。
- 手を汚さずに塗れる容器で、肩や背中などの塗りにくい患部にも楽に塗れます。



## ⚠ 使用上の注意

### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (2) ぜんそくを起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。
  - (1) 目の周囲、粘膜等
  - (2) 湿疹、かぶれ、傷口
  - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 長期連用しないでください。

### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

## 用法・用量

1日4回を限度として適量を患部に塗布してください。

\* 11歳未満の小児には使用させないでください。

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 1週間あたり50mLを超えて使用しないでください。
- (5) 塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。



## 成分・分量 100g中

成分	含量	はたらき
インドメタシン	1.0g	非ステロイド性の鎮痛消炎成分で、痛みやはれのもとに直接作用して、筋肉や関節の痛みや炎症をやわらげます。
ℓ-メントール	3.0g	さわやかな清涼感により、痛みをやわらげます。

添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、イソプロパノール、チオ硫酸Na、エドト酸Na、オキシベンゾン、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、ベンジルアルコール、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 本剤が衣服や寝具などに付着し、汚れた場合にはなるべく早く洗い落としてください。
- (6) メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (7) 本剤の付いた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (8) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

### お問い合わせ先

お客様相談窓口 ☎0238(46)2013  
月～金曜日 9:00～17:00 (祝日を除く)

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**  
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930